

Gen. XVIII. **PASTOCORIS** REUT.*Oncotylus* p. REUT. olim.

Tab. I, fig. 18.

Diagnosis: Corpus oblongum (δ) vel oblongo-ovatum (φ), subtiliter pubescens, capite verticali, antice viso quinquangulari, transverso, a latere viso altitudine breviore, fronte convexiuscula, clypeo ab ea discreto, prominente, angulo faciali sub-recto (φ) vel acutiusculo (δ); oculis maris magnis in capitibus latera longius extensis; rostro medium coxarum intermediarum attingente, articulo primo medium xyphi prosterni sub-attingente; antennis in linea intermedia oculorum partis inferioris (δ) vel infra hanc (φ) insertis, articulo secundo maris capitis latitudine sat multo longiore, duobus ultimis conjunctis secundo paullo longioribus; pronoti apice medio sinuato; xypho prosterni lateribus marginato; tarsis posticis longis, articulo tertio secundo paullulum longiore, ungiviculis longis, leviter curvatis, dente basali obtuso, aroliis brevibus, ungiviculorum tertiam basalem partem vix superantibus.

Habitat species unica in parte meridionali territorii.

Descr.: Ab *Oncotylo* FIEB., REUT. rostri articulo primo longiore, tarsorum posteriorum articulo tertio secundo paullo longiore, aroliis multo brevioribus etc. divergens. A *Solenoxypho* REUT. capite minus crasso, oculis praesertim maris in genas longe extensis, rostro breviore, ejus articulo primo articuloque secundo antennarum longioribus, xypho prosterni praesertim maris distincte marginato, tibiis nigro-spinulosis, tarsis longioribus ungiviculisque levius curvatis distinctus. Corpus oblongum (δ) vel oblongo-ovatum (φ), subtiliter pubescens. Caput basi pronoti circiter $\frac{2}{3}$ (φ) vel fere tantum paullo minus quam duplo (δ) angustius, fere verticale, antice visum distincte transversum (δ) vel latitudini longitudine sub-aequale (φ), a latere visum altitudine brevius vel huic longitudine sub-aequale, fronte maris magis declivi, feminae convexiuscula, clypeo a fronte bene discreto, sub angulo acuto prominente, fere perpendiculari, basi in linea oculorum intermedia vel paullulum infra hanc (φ) posita, angulo faciali acutiusculo vel sub-recto (φ), genis maris humilibus, feminae sat altis, gula obliqua. Oculi in capitibus lateribus sub-perpendiculariter positi, maris maximi, valde convexi et prominentes, in genas longissime extensi, orbita interiore fortius sinuati; feminae breviores, in genas parum extensi, orbita interiore vix sinuati. Antennae in linea intermedia partis inferioris oculorum (δ) vel paullo infra hanc insertae, articulo secundo capitibus latitudine postica sat multo longiore, duobus ultimis conjunctis hoc distincte longioribus. Pronotum brevius trapeziforme, lateribus in mare sub-sinuatis, callis parum elevatis, apice medio in femina distinctius, in mare obsoletius sinuato, disco apicem versus vix declivi. Scutellum basi detectum. Hemelytra completa, feminae abdomen pa-