

punctorum nigrorum fronteque punctis nigris in anulum positus, vitta lata media fere a basi et fere usque in apicem clypei excurrente, ad clypei basin angustius interrupta nigra, in fronte cum lineis transversis confluenta. Oculi fusci, feminae in capitis lateribus sat oblique positi, in genas ne minime quidem extensi, orbita anteriore apicem versus divergentes, haud sinuati. Rostrum medium coxarum intermediarum attingens, dimidio apicali piceo-nigrum. Antennae (♀) ad apicem oculorum interne insertae, colore corporis, fortiter nigro-pubescentes, articulo primo obconico, apicem clypei circiter $\frac{2}{5}$ longitudinis superante, nigro-punctato, anulo angusto ante basin alioque apicali nigricantibus; articulo secundo basi pronoti distincte longiore, lineari, dimidio basali nigro-punctulato, apicem versus ferrugineo, apice nigro-fusco; duobus ultimis nigris, simul sumtis secundo longitudine aequalibus, quarto tertio triplo brevioribus. Pronotum basi longitudine tantum paullo magis quam $\frac{1}{3}$ latius, apice longitudini latitudine subaequale, lateribus rectis, disco apicem versus vix declivi, callis magnis, optime discretis, nitidulis, margine eorum postico impresso; flavo-virens, punctis nigris praesertim apicem versus adpersum, pone callos et mox ante medium fascia sat lata medio interrupta, angulis basalibus maculisque duabus semilunaribus marginis basalis nigris. Scutellum flavo-virens, atomis nigris adpersum, punctis duobus basalibus lateribusque nigris. Hemelytra sordide flavo-virentia, venis et suturis glabris, clavo, vena excepta, vittisque duabus longitudinalibus corii nec non angulo corii interno punctis fuscis vel nigricantibus conspersis; membrana cum areolis nigricante, venis sub-sulphureis, areola minore punctoque infra apicem venae cubitalis nigris. Pectus et abdomen sordide virentia, nigro-pubescentia. Pedes colore corporis, dense nigro-pubescentes, femoribus supra et subter punctis magnis nigris dense et irregulariter conspersis; tibiis spinulis nigris e punctis sat magnis nigris nascentibus, basi tibiatarum adhuc minute nigro-punctata, apice tibiatarum tarsisque cum unguiculis nigris.

3. *Oncotylus vitticeps* REUT.

Diagnosis.: Pallide viridi-flavens, supra nigro-setulosus, capite, marginibus callorum pronoti, antennis pedibusque nigro-pubescentibus, articulo primo antennarum, femoribus et tibiis punctis nigris remotis; capite fronte et clypeo nitidis, vitta longitudinali media, in fronte punctis formata, nigra vel nigro-fusca; antennarum articulo secundo lineari. Long. ♀ fere 6 mm.

Hab. in Turkestan (Soch!), D. FEDTSCHENKO.

Descr.: Corpus oblongo-ovatum (♀), viridi-flavens, supra nigro-setulosum. Caput basi pronoti vix magis quam $\frac{1}{4}$ angustius, leviter nutans, antice visum latitudini longitudine aequale, a latere visum altitudinem latitudine clypei superans, vertice oculo duplo latiore, fronte convexiuscula, nitida, clypeo nitido, late perpendiculariter prominente, gula circiter tertiam partem capitis longitudinis occupante, levius obliqua; viridi-flavum, vertice serie marginali punctorum nigrorum, fronte superne punctis quinque nigro-fuscis in angulum rectum positus, apice anguli ad marginem verticis vergente, ab hoc usque ad apicem frontis punctis majoribus nigro-fuscis confluentibus et vittam lon-