

gitudinalem formantibus, in parte frontis inferiore punctis parvis nonnullis fere in circulum positis, clypeo medio vitta nigro-fusca. Oculi prominentes, feminae in genas haud extensi et orbita interiore apicem versus divergentes, sed haud sinuati, nigri. Rostrum apicem mesosterni haud attingens, apice nigro, articulo primo capite paullo brevior. Antennae colore corporis, nigro-pubescentes, articulo primo leviter obconico, supra medio punctis duobus geminatis fuscis apiceque atomis nonnullis fuscis notato, intus seta nigra ornato, articulo secundo lineari, gracili, latitudine pronoti basali $\frac{1}{3}$ longiore, duobus ultimis nonnihil fuscescentibus, simul sumtis hoc vix longioribus, quarto tertio paullo magis quam duplo brevior. Pronotum basi longitudine circiter $\frac{3}{4}$ latius, angulis posticis rotundatis, lateribus rectis et sat acutis apicem versus modice angustatum, apice late sinuato longitudine paullo latius, disco sub-horizontale, callis optime discretis, sat convexis et marginibus impressis; virescenti-flavum, punctis nonnullis fuscis in marginibus callorum positis. Scutellum flavo-virescens, unicolor. Hemelytra virescenti-flava, nigro-setulosa, vena cubitali glabra; membrana sub-hyalina, venis albidis, areolis disco fuscescentibus. Pectus et abdomen virescenti-flava, pallido-pubescentia. Pedes corporis colore, nigropubescentes, femoribus supra atomis ad marginem inferiorem aliisque prope apicem oblique positis, subtus punctis in series tres longitudinales positis fuscis, tibiis spinulis longioribus nigris e punctis sat magnis nigro-fuscis nascentibus, apicibus tiliarum tarsisque totis nigris.

4. *Oncotylus desertorum* REUT.

Diagnosis.: Virescenti-albus, subtiliter pallido- vel albedo-pubescentis, supra etiam praesertim in hemelytris longius nigro-pubescentis; antennis pedibusque subtilius nigro-pubescentibus, illis nigris, articulo secundo basin versus fusco vel albicante, primo semper albo-virescente; his femoribus apice saepe obsoletius fusco-conspurcatis, apice tiliarum tarsisque nigris; clavo margine scutellari commissuraque fuscis; membrana fere innotata (♀) vel areola majore ad suturam membranae, areola minore fere tota maculaque infra apicem venae cubitalis fuscis vel nigricantibus; articulo secundo antennarum crassiusculo; oculis magnis, maris maximis, vertice latioribus. Long. $5\frac{3}{4}$ —6 mm.

Hab. in Turkestan (Kitsilkum!), D. FEDTSCHENKO.

Descr.: Corpus (♂ ♀) oblongum, albo-virescens vel virescenti-album, subtiliter albedo-pubescentis, supra etiam praesertim in hemelytris pilis longioribus nigris divellendis pubescens. Caput basi pronoti circiter $\frac{3}{7}$ (♂) vel duplo (♀) angustius, fortiter nutans, antice visum latitudini longitudine aequale (♀) vel sub-aequale (♂), a latere visum altitudini longitudine aequale (♂) vel hanc latitudine clypei superans (♀), parte ante-oculari oculi latitudini in mare haud, in femina fere dimidio latiore, vertice oculo paullo angustiore (♂) vel $\frac{1}{3}$ latiore (♀), fronte vix vel parum convexa, clypeo sat late prominente, perpendiculari, gula $\frac{2}{5}$ (♀) vel $\frac{1}{3}$ (♂) longitudinis capitis occupante. Oculi maris maximi, valde convexi et prominentes, in genas longissime extensi, orbita inte-