

8. *Oncotylus pulchellus* REUT.

Diagnosis: Vitellinus, supra dense nigro-pilosus, oculis, antennis extrorsum apiceque rostri, tibiaram et tarsorum fuscis; membrana vix infuscata, areolis cum venis totis pulchre vitellinis; tibiis parce et subtiliter pallido-spinulosis. Long. ♀ $3\frac{3}{4}$ mm.

Syn.: *Oncotylus pulchellus* REUT., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1874, 48, 23! Hem. Gymn. Sc. et F. 159, 2!

Hab. in Svecia media (Stockholm!), D. Prof. BOHEMAN.

Descr.: Corpus ovale (♀), aurantiaco- vel luteo-flavescens, supra dense nigro-pilosum. Caput basi longitudini latitudine subacuale, fere verticale, vertice basi marginato, clypeo a fronte distincte discreto; gula brevi. Oculi mediocres, granulati, nigri, margine interiore apicem versus divergentes. Rostrum coxas intermedias attingens, apice fusco. Antennae prope oculorum marginem anteriorem inferne insertae, $\frac{2}{3}$ corporis longitudine, articulo primo dimidio longitudinis caput superante, duobus ultimis simul sumtis secundo longitudine sub-aequalibus, quarto tertio fere triplo brevior. Pronotum breviter trapeziforme, apice longitudine paullo latius, basi longitudine circiter triplo latius, marginibus acutis, disco antico linea transversali impressa notato. Scutellum triangulare, apice albido. Hemelytra pronoto magis quam quintuplo longiora; cuneo margine externo corio magis quam triplo brevior; membrana leviter infuscata, macula parva ad apicem cunei hyalino-albida, venis areolisque pulchre flavis. Pedes flavi, tibiis pallido-spinulosis, apice eorum summo apiceque tarsorum nigris.

9. *Oncotylus persicus* REUT.

Diagnosis: Glauco-virescens, parce pallido-pubescentibus, hemelytris pilis nigris fragilibus, antennis et pedibus nigro-pubescentibus, illis, femoribus basi que scutelli lutescentibus, femoribus posticis ad apicem atomis nonnullis fuscis conspurcatis, tarsorum testaceorum articulo ultimo cum ungviculis fusco-nigro; hemelytris pallidis, cuneo venisque membranae dilutissime sulphureis, membrana medio arcu angusto arcui venarum concentrico et ab hoc sat longe remoto fuscescente; capite fortius transverso, articulo secundo antennarum lineari. Long. ♂ $5\frac{1}{4}$ mm.

Hab. in Persia boreali (Schachrud!), a D. JAKOVLEFF communicatus.

Descr.: Corpus glauco-virescens, supra parce pallido-pubescentibus, hemelytris pilis nigris faciliter divellendis. Caput (♂) basi pronoti fere $\frac{2}{3}$ angustius, cum oculis fortiter transversum, fortius nutans, antice visum breviter quinquangulare, a latere visum altitudini longitudine aequale, vertice oculo paullo magis quam dimidio latiore, fronte declivi, haud convexa, clypeo quam in plerisque hujus generis minus fortiter et late prominente, gula fere dimidium capitis longitudinem occupante. Oculi (♂) fortiter prominentes, magni, convexi, granulati, orbita inferiore apicem versus late sinuati. Ro-