

1. *Onychumenus decolor* FALL.

*Diagnosis:* Cinereus vel flaventi-, virescenti- vel fuscescenti-cinereus, opacus, subtilissime parcius pallido-pubescentis; gutta media frontis, linea transversali verticis basique scutelli vel scutello toto flaventibus vel luteis; limbo externo hemelytrorum pallido; pronoti callis plerumque nigro-fuscis; apice tibiarum tarsisque nigris. Long. ♂ ♀  $4\frac{1}{2}$ — $4\frac{4}{5}$  mm.

*Syn.:* *Capsus decolor* FALL., Hem. Svec. 123, 16! MEY., Rh. Schw. 86, 68. F. SAHLB., Mon. Geoc. 95, 8! KIRSCHB. Rh. Wiesb. 77, 91. FLOR, Rh. Livl. I, 555, 49. *Capsus (Phylus)* id. THOMS., Op. ent. IV, 452, 120. *Oncotylus* id. FIEB., Eur. Hem. 298, 1. DOUGL. et SC., Br. Hem. 393, 1, Tab. XIII, fig. 2. REUT., Hem. Gymn. Sc. et F. 168, 1! SAUND., Syn. Br. Hem. 299, 1. — *Lopus chrysanthemii* HAHN, Wanz. Ins. I, 10, fig. 4. — *Capsus palliatus* PERR., Nouv. exc. dans les grandes Landes, p. 86 (extr. ex Ann. Soc. Linn. Lyon 1857).

*Hab.* in *Chrysanthemo* et in *Hieraciis* per partem occidentalem centram et borealem Europae: Hispania, Gallia, Helvetia, Italia borealis et centralis, Galizia, Austria, Bavaria, Borussia, Alsacia, Britannia, Dania, Svecia australis et media, Fennia australis, Karelia rossica, Livonia.

*Descr.:* Corpus elongatum (♂) vel sub-ovale (♀), cinereum vel flaventi-, virescenti- vel fuscescenti-cinereum, subtilissime breviter pallido-pubescentis. Caput pallide ochraceum, puncto verticis ad oculus lineisque transversalibus frontis ferrugineis vel fuscocinereum, frontis vitta vel gutta discoidali verticisque stria transversali flaventibus, vertice oculo duplo (♂) vel circiter duplo et dimidio (♀) latiore. Oculi fuscii. Rostrum sordide flavescens, apice nigro, vel piceo-nigro, basin versus flavescens. Antennae cinerae, subtiliter pubescentes, maris corporis longitudine, feminae hoc circiter  $\frac{1}{4}$  breviores, articulo primo capite circiter duplo brevior, secundo ipsa basi albida, latitudine basali pronoti brevior duobus ultimis conjunctis secundo longioribus, quarto tertio circiter duplo (♀) vel  $\frac{3}{5}$  (♂) brevior. Pronotum callis saepe nigro-fuscis. Hemelytra limbo laterali saepeque etiam cuneo pallidis, membrana unicoloriter grisea. Pectus et abdomen obscure cinerea, maculis lateralibus pectoris segmentorumque ventralium marginibus praesertim in femina sordide flaventibus. Pedes corporis colore, femoribus serie punctorum obsoletiorum, tibiis spinulis nigris sat subtilibus, ipsa basi apiceque tibiarum nec non tarsis totis fuscis.

Gen. XXII. **ATOMOPHORA** REUT.

Tab. I, fig. 14.

*Diagnosis:* Corpus oblongum, pilis nigris destitutum, supra punctis fuscis conspersum; capite sub-verticali transverso vel sub-transverso, haud producto, sat parvo, clypeo sat anguste et sat compresso, fortiter prominente, gula brevissima; oculis magnis, orbita interiore ad medium usque parallelis vel sub-