

parallelis, dein in femina minus fortiter, in mare profunde sinuatis, feminae in genas sat longe extensis, maris longissimis et maximis ad gulam vel ab bucculas usque prolongatis et tota latera capitis occupantibus; rostro coxas intermedias attingente vel sub-attingente, articulo primo apicem capitis haud superante; pronoto margine apicali recto vel sub-recto; xynho prosterni triangulari, late marginato; tarsis posticis articulo tertio secundo longitudine aeqvali, ungviculorum aroliis valde laminato-explanatis.

Habitant species hujus generis in desertis partis austro-orientalis territorii.

Descr.: Corpus oblongum, pallido-pubescent, opacum, supra punctis fuscis conspersum. Caput sat parvum vel mediocre, transversum vel sub-transversum, apicem versus haud productum, sub-verticalis, a latere visum longitudine et altitudine sub-aequalibus, clypeo sat angusto, compresso, fortiter prominent, basi a fronte discreto, ipsa basi in linea oculorum intermedia posita, gula brevissima. Oculi magni, maris maximi, latere externo late rotundati, orbita interiore ad medium usque parallelis vel sub-paralleli, dein autem in femina minus fortiter, in mare profunde sinuati iterumque apicem versus prominentes, feminae in genas sat longe, maris longissime extensi, tota latera capitis occupantes et ad bucculas vel ad gulam usque producti. Rostrum coxas intermedias attingens, articulo primo caput haud superante. Antennae longe supra apicem oculorum in eorum sinu insertae, articulo primo clypei apicem haud vel paullo superante. Pronotum trapeziforme, marginibus omnibus rectis vel apice vix visibiliter sinuato. Scutellum basi detectum. Hemelytra completa, membrana bi-areolata. Alae hamo areolae e vena subtensa excurrente, a basi venae decurrentis paullulum remoto vel a basi ipsa venae decurrentis emissio. Xynhus prosterni triangulare, lateribus late, sed haud alte marginatus, disco haud concavum, ut xynhus saepe fere utrinque bi-impressus videtur. Mesosternum planum, horisontale, apice medio latius et profunde emarginatum. Coxae breves, anticae basin mesosterni tantum paullulum superantes. Tibiae subtilius spinulosae. Tarsi postici articulo tertio secundo longitudine aeqvali, ungviculis sat magnis. Segmentum genitale maris muticum, terebra feminae ventris medium superans.

1. *Atomophora eximia* REUT.

Diagnosis: Supra fulva, pallido-pubescent vel sub-glabra, pronoto, scutello hemelytrisque punctis fuscis inaequaliter conspersis, basi cunei late albida, innotata, membrana in limbi externi dimidio basali fusco maculis tribus albidis notata; antennis, pedibus ventrisque medio pallide flaventibus, femoribus apicem versus fulvo-rufis, punctis fuscis adspersis, tibiis spinulis testaceis e punctis parvis nigro-fuscis nascentibus; mesosterno lateribusque ventris fuscis. Long. ♂ $4\frac{1}{2}$ mm.

Hab. in Turkestan (Taka!), D. FEDTSCHENKO.

Descr.: Corpus supra flavum, pallido-pubescent vel sub-glabrum. Caput latitudine pronoti basali circiter $\frac{2}{5}$ angustius, fulvum, gutta verticis media, linea media lon-