

Var. ♂, punctata: Diagn.: Pallide flava vel albicans, subtus longius subtiliter albido-pubescentis, supra parce breviterque pallide flavo-pubescentis, abdomine apicem versus lateribusque sanguineo (♀) vel virescente (♂), dorso nigro; scutello flavescente vel apicem versus leviter rufescente, linea media albida vel pallida; hemelytris albidis, punctis dilute fuscis breviter piliferis ubique adpersis, venis clavi, vena corii cubitali maculisque nonnullis irregularibus dilute aurantiaco-flavis vel rubris; membrana venis pallide flaventibus; antennis pedibusque pallide flaventibus, illarum articulo secundo capitis latitudine paullo longiore (♂) vel hac brevior (♀), his atomis minutissimis dilute fuscis adpersis, femoribus etiam subtus serie punctorum fuscorum, tarsis apice fuscis. Long. $4\frac{1}{2}$ mm.

Descr.: A *S. Putoni* FIEB. vertice feminae angustiore, rostro fere paullo longiore, colore et hemelytris punctis pilas breves pallidas emittentibus adpersis distincta videtur. Corpus oblongum (♂) vel ovatum (♀), pallide flavens vel albicans, subtus longius subtiliter pallido-pubescentis, supra pilis pallidis parce pubescens. Caput albido-flavens, puncto verticis utrinque, lineis frontis transversalibus duabusque clypei longitudinalibus aurantiacis vel carneis; vertice oculo tantum $\frac{1}{4}$ (♂) vel dimidio (♀) latiore. Rostrum coxas intermedias attingens, apice nigro. Oculi fusci, maris magni. Antennae pallide flaventes, pallido-pubescentes, articulo secundo primo circiter duplo longiore, latitudine capitis paullo (♂) longiore vel (♀) hac brevior, apice articuli primi basi que secundi praesertim in mare atomis minutissimis dilute fusciscentibus parce adpersis. Pronotum basi longitudine duplo fere latius, apice longitudini aequale vel paullo latius, pallide flavens (♂) vel albicans, callis sub-carneis (♀), disco saepe maculis nigris quatuor e mesonoto translucens. Scutellum aurantiaco-flavum, linea media pallida (♀), vel albido-flavens, basi aurantiaca, apice linea media albida, disco punctis fusciscentibus consperso, circa lineam mediam latius leviter fumato. Hemelytra abdomen longius superantia (♂) vel huic longitudine aequalia (♀), albida, punctis dilute fuscis (in femina obsoletioribus) piliferis ubique adpersa, vena clavi venaque cubitali corii fere totis vel maculatim aurantiacis vel carneis, maculis nonnullis dilute aurantiacis vel carneis haud confluentibus irroratis. Pectus pallide flavens. Abdomen virescens (♂) vel albicans, apicem versus, maculis magnis connexivi lineaque utriusque segmenti ventralis ejus margini parallelo fere sanguineo rubris (♀); dorso nigro. Pedes pallide flaventes, pallido-pubescentes, femoribus tibiisque praesertim basin versus atomis minutissimis fusciscentibus adpersis, illis subtus serie punctorum fuscorum; tarsorum articulo tertio fusco, apice unguiculisque nigris.

Oncotylus trisignatus ASSM., pag. 275, lin. 13, infra, adde: *Cimex Tanacetii* SCHRANCK, Faun. Boic. 92, 1153 (verisimiliter). Descriptio D:ni SCHRANCK l. c. his verbis legitur: „Reinfarrn F. 1153: Sittichgrün; sechs Punkte auf dem Rückenschilde, zweien am Grunde des Schildchens und der äusserste Rand der Halbdecken schwarz.

Cimex Tanacetii.

Cimex viridiflavus Göze Beytr. II, 267. n. 73.

La punaise jaune à corcelet tacheté et étuis verts. *Geoffr. par. I, 455. n. 39.*