

pronoto paullo (♂) vel haud (♀) longiore, articulo tertio secundo magis quam  $\frac{1}{4}$  (♂) vel  $\frac{1}{5}$  (♀) brevior. Long ♂  $7\frac{1}{2}$ , ♀ 8 mm.

Habitat in Sibiria; Amuria (Mus. Holm).

#### 8. *Scolopostethus maderensis* n. sp.

Niger, supra remotius sat longe pallido-pilosus, pronoto marginibus antico et lateralibus loboque postico flaventibus vel ferrugineis, hoc maculis quatuor nigris; hemielytris fuscis, basi usque ad apicem scutelli testaceis, fusco-punctatis; membrana obscure fusca angulis basalibus interiore et exteriori pallidis; maculis ad coxas, antennarum fuscis articulis duobus primis basi tertii nec non pedibus flavo-testaceis, femoribus anticis fere totis, annulo anteaicali femorum posteriorum apiceque tibiarum anticarum (maris fortiter curvatarum et ante apicem inferne denticularum) nigris; pronoti lobo antico fortiter convexo; mesostethio mutico. Long. 4 mm.

Habitat in insula Madera (Mus. Holm).

#### 9. *Camptobrochis parvulus* n. sp.

Breviter ovalis, supra ubique subtiliter dense pallido-pubescentis, obscurius ochraceus, corio et cuneo sub-ferrugineis, membrana fuliginosa, infra cunei apicem late pallida, vena brachiali magnam ad partem picea; meso- et meta-stethiis, abdomine articuloque ultimo antennarum piceis; antennis cetero pedibusque pallide flaventibus, illis articulo ultimo penultimo duplo fere brevior; pronoto hemielytrisque dense concoloriter punctatis; scutello transverso, apice subtiliter strigoso. Long. ♀  $2\frac{2}{3}$  mm.

Habitat in insula Madera (Mus. Holm).

Species statura minore, clypeo minus prominente, antennarum structura pubescentiaque corporis mox distinguenda.

#### 10. *Heterocordylus parvulus* n. sp.

Niger, albido-tomentosus, antennis pedibusque totis concoloribus; vertice margine rotundato distincte carinato-elevato; antennis articulo secundo fere toto incrassato, maris cylindrico, feminae sub-fusiformi. Long.  $3\frac{1}{4}$  mm.

Habitat in *Ulice* Galliae meridionalis; Roscoff, Rouen, sec. sp. in coll. Dr. Puton; in Mus. Holmiensi specimina e Gallia meridionali a. D. Leon-Dufour olim lecta examinavi; in Mus. Berolinensi individuum e Lusitania vidi.

*H. unicolori* Hahn similis, sed multo minor, structura antennarum articuli secundi distinctus.