

retrorsum distincte vergentes et angulis pronoti anticis contigui. Rostrum rufo-ferrugineum vel nonnihil fuscescens, coxas intermedias attingens, articulo primo medium xypho prosterni attingente. Antennae dimidio corpori cum hemielytris fere aequelongae, articulo primo clypeum parum superante, fulvo-rufo vel rufo-ferrugineo, secundo latitudine basali pronoti vix breviore vel (♀) aequelongo, nigro vel versus basin angustius fusco-rufescens vel (♀) fulvo-rufo, versus apicem leviter fuscescens, subtiliter nigro-pubescente, a basi gracili versus apicem sensim levius incrassato, duobus ultimis simul sumtis secundo circiter $\frac{1}{3}$ brevioribus, fuscis vel nigro-fuscis. Pronotum trapeziforme, basi quam apice duplo (♂) vel circiter dimidio (♀) latius, apice longitudine circiter $\frac{1}{5}$ angustius (♂) vel fere latius (♀), disco versus apicem maris fortius, feminae levius convexo-declive, transversim fortius rugulosum, apice latius distincte reflexo. Scutellum transversim subtilissime strigosum. Hemielytra abdomen paullo (♀) vel maxima parte membranae (♂) superantia, nigro-fusca, densissime et subtiliter subrugoso-punctata, cuneo apice truncatulo; membrana infumata, areola majore limboque externo late fuscescens, venis fuscis, areola minore maculaque ad apicem cunei triangulari hyalinis. Pedes (saepe cum coxis) fulvo-rufi, tibiis parcus subtiliter concoloriter spinulosis, apice earum tarsisque nigro-fuscis, tarsorum posticorum articulo secundo tertio breviore. Forceps maris dextra laminata margine supero denticulis quatuor, sinistra uncinata, latere in angulo longe acuminato-producta. Terebra feminae longa, quartam basalem partem ventris attingens, squama basali magna, triangulari.

Gen. VI. **PLATYTOMATOCORIS** REUT.
Excentricus pars REUT.

Diagn.: Corpus oblongo-ovale, squamis albis divellendis vestitum, capite levissime nutante, antice viso sub-triangulari, ante oculos longius producto, a latere viso fere tetragono, basi quam apice parum altiore, altitudine circiter duplo longiore, clypeo compresso basi in plano frontis posito, a fronte obsoletius discreto, a latere viso basi quam apice latiore, medio impresso, angulo faciali acutiusculo, loris haud discretis; oculis superne visis ovalibus, leviter prominentibus, orbita interiore recta fortiter divergentibus; rostro coxas posticas attingente, gracili; antennis articulis duabus primis pilosis, primo valde incrassato, obconico, secundo late compresso, lanceolato et latissime subsulcato, ultimis gracillimis; pronoto transverso-trapeziformi, lateribus rectis, basi truncato.

Habitat in regione media territorii.

Descr.: Gen. *Excentrico* REUT. (typo *E. punctipedi* FIEB.) primo intuito simillimus, differt autem alarum areola hamo destituta, xypho prosterni utrinque distinctissime marginato, antennarum articulo secundo fortiter compresso, aroliis ungivicularum liberis distinctis etc. A gen. *Heterotoma* LATR. divergit capite longiore, frontis apice basique clypei in eodem plano positis, obsoletius discretis, loris haud discretis, pronoto multo magis transverso etc. Corpus oblongo-ovale, nitidulum, praesertim inferne squamis faciliter divellendis vestitum. Caput levissime nutans, cum oculis apice pronoti distincte