

pellucentibus; tibiis spinulis subtilibus pallide testaceis. Long. ♂, ♀ 3 $\frac{1}{3}$ —3 $\frac{1}{2}$ mm.

Hab. in *Cupresso pyramidalis*: Gallia meridionalis (Avignon!), comm. D. Dr. PUYON.

Descr.: Species parvula a reliquis affinibus corpore brevior et latiore hemielytris haud pellucentibus mox distinguenda. Corpus oblongum vel oblongo-ovatum (♀), superne longe et densius flavo-pubescentis, in pronoto fere pilosum, pilis nigris nullis. Caput (♀, marem solum unicum nimis mutilatum vidi) pronoti basi circiter duplo angustius, vertice subtiliter marginato, margine acutiusculo, oculo circiter $\frac{1}{3}$ latiore, fronte convexiuscula, clypeo basi supra lineam inter scrobes antennarum ductam et fere in linea oculorum intermedia posita. Oculi virescentes. Rostrum apicem coxarum posticarum attingens, apice nigro. Antennae colore corporis, subtiliter pubescentes, articulo primo (♀) capite duplo brevior, secundo primo fere quadruplo longior, duobus ultimis conjunctis secundo brevioribus. Pronotum basi longitudine magis quam duplo latius. Scutellum saepe flavescens. Hemielytra virescentia, haud diaphana, membrana levissime fumata, macula ad apicem cunei hyalina, venis dilute flavo-virentibus, areolis venis concoloribus laevibus nitidis semipellucentibus. Pedes colore corporis, tibiis spinulis gracilibus sat longis pallido-testaceis, tarsis apice fuscis. Segmentum maris genitale magnum, forcipibus magnis, dextra margine interiore quam exteriori longior, leviter arcuata, margine supero oblique sinuato, angulo apicali interiore breviter obtuse producto, exteriori in apiculum fere transversalem prolongato.

8. *Orthotylus marginalis* REUT.

Tab. I, fig. 7 a, b, (caput). Tab. V, f. 9, (forcipes).

Diagn.: Oblongus, virescens, supra viridis, supra pallide flavescenti-pilosus; antennis ferrugineis, apicem versus fuscis, articulo primo maris versus basin saepeque etiam basi secundi fuscis; rostro coxas intermedias attingente; scutelli basi flavescens, hemielytris haud pellucentibus, clavo sutura corioque stria juxta marginem exteriorem plerumque flavescens; membrana grisescente, venis viridibus; tibiis longius pallido-spinulosis, apice tibiatarum tarsisque fuscis vel his basin versus testaceis. Long. ♂, ♀ 5 $\frac{1}{2}$ —7 mm.

Syn.: *Phytocoris nassatus* FALL., Hem. Sv. 80, 7! nec FABR. ZETT., Ins. Lapp. 272, 4. KOL., Mel. ent. II, 177, 96. *Lygus* id. HAHN, Wanz. Ins. I, 149, 75. *Capsus* id. MEY., Rh. Schw. 50, 8. F. SAHLB., Mon. Geoc. 102, 24! KIRSCHB., Rh. Wiesb. 78, 98. FLOR, Rh. Livl. I, 618, 94. *Orthotylus* id. FIEB., Eur. Hem. 289, 6! REUT., Hem. Gymn. Sc. et F. 148, 4! SAUND., Syn. Br. Hem. 292, 5. *Litosoma* id. DOUGL. et SC., Br. Hem., 337, 3, Tab. XI, fig. 3. *Capsus (Orthotylus)* id. THOMS., Op. ent. IV, 439, 71!

Hab. in foliis *Alni*, *Salicum* et *Pyri mali*: Lapponia—Hispania—Graecia—Sibiria (Irkutsk).

Descr.: Ab *O. flavimervi* KIRSCHB., cui simillimus, colore venarum membranae mox distinguendus; a speciebus reliquis statura majore, hemielytris haud diaphanis, membrana