

pallide flaventes, subtilissime pallido-pubescentes, pilis pro certo lumine nonnihil fusciscentibus, corpore cum hemielytris circiter  $\frac{1}{4}$  breviores, articulo primo capite brevior, secundo hoc fere quadruplo longiore, tertio secundo circiter  $\frac{1}{3}$  vel fere  $\frac{1}{4}$  brevior et quarto duplo — fere  $2\frac{1}{3}$  longiore, hoc primo vix (♀) vel fere  $\frac{1}{3}$  (♂) longiore; articulo secundo pilis exsertis destituito. Pronotum trapeziforme, lateribus rectis, callis discretis. Hemielytra subpellucida, unicolora, membrana cum areolis hyalina, venis saturate viridibus. Pedes dilute virescentes, femoribus anticis margine inferiore pilis longis exsertis destitutis, tibiis versus apicem saepe in testaceum vergentibus, spinulis subtilibus pallido-testaceis, tarsis articulo tertio ipso apice fuscis. Segmentum maris genitale magnum, sex praecedentibus simul sumtis longitudine aequale, sed illis vix latius, forcipibus mediocribus, dextra bidentata, dentibus brevibus, fere aequae alte productis, interiore lato et margine inferiore versus apicem valde curvato.

#### 14. *Orthotylus propinquus* REUT.

Tab. V, fig. 17 (forcipes).

*Diagn.:* Elongatus, virescens, albido-pubescentis; vertice sat obsolete marginato, maris oculo mediocri duplo latiore; rostro coxas posticas attingente; antennis articulo primo capite duplo fere brevior, secundo duobus ultimis conjunctim longitudine aequali et primo circiter quadruplo longiore, tertio secundo paullo magis quam  $\frac{1}{3}$  brevior et quarto circiter  $2\frac{1}{3}$  longiore, hoc primo paullo longiore, saepe fusciscente; venis membranae saturate viridibus; tibiis pallido-spinulosis, tarsis apice fusco, unguiculis testaceis; segmento maris genitali magno, reliquis simul aequae longo et lato, forcipe sinistra magna, dextra obtriangulari, apice subtruncata. Long. ♂  $4\frac{1}{2}$  mm.

*Hab* in Hispania!, D. STAUDINGER.

*Descr.:* Ab *O. diaphano* KIRSCHB. structura capitis, segmenti genitalis, femoribus subtus haud setosis etc. bene distinctus. Ab *O. prasino* FALL. et *Scotti* REUT. vertice sub-carinato, corpore supra subtilius pubescente praesertimque structura forcipum diversa distinguendus. Corpus elongatum, supra albido-pubescentis, post mortem antice flavescens. Caput pronoti basi fere duplo angustius, saltem post mortem flavescens, vertice obsolete marginato et oculo duplo latiore, fronte convexiuscula, clypeo verticali, basi in linea inter scrobes antennarum ducta posita. Oculi virescentes, post mortem fuscis. Rostrum coxas posticas attingens, apice nigro. Antennae corpore cum hemielytris circiter  $\frac{1}{4}$  breviores, pallide flaventes, sat subtiliter pallido-pubescentes, pilis in certa luminis directione leviter fusciscentibus, articulo primo capite fere duplo brevior, secundo hoc circiter quadruplo longiore, tertio secundo paullo magis quam  $\frac{1}{3}$  brevior, quarto tertio circiter  $\frac{4}{7}$  brevior, saepe fusciscente. Pronotum trapeziforme, basi longitudine fere duplo latius, lateribus rectis, callis disci discretis, virescens, post mortem saepe antice flavescens. Scutellum saltem post mortem flavescens. Hemielytra viridia, venis membranae subhyalinae saturate viridibus. Corpus subtus pallide flavescens. Pedes pallide