

distincte (♂) vel obsolete (♀) marginato; rostro apicem coxarum intermediarum attingente vel paullulum superante; antennis articulo secundo latitudine pronoti basali longiore, articulo tertio secundo tantum circiter $\frac{1}{7}$ — $\frac{1}{8}$ brevior et quarto circiter duplo longiore; hemelytris maculis flavis adspersis; membrana dilute fumata, venis cum maxima parte areolarum vel areolis totis saturate viridibus; tibiis subtiliter testaceo-spinulosis, tarsis apice nigris. Long. ♂ $3\frac{2}{3}$ —4, ♀ $3\frac{2}{5}$ mm.

Syn.: *Phytocoris flavosparsus* C. SAHLB., Act. Soc. Sc. Fenn. I, 411! BOH., Nya Sv. Hem. 13, 18! *Capsus* id. F. SAHLB., Mon. Geoc. 103, 26! KIRSCHB., Rh. Wiesb. 89, 120. FLOR, Rh. Livl. I, 582, 66. *Orthotylus* id. FIEB., Eur. Hem. 288, 2. REUT., Hem. Geoc. Sc. et F. 151, 8! SAUND., Syn. Br. Hem. 292, 8! *Litosoma* id. DOUGL. et Sc., Br. Hem. 311, 7. *Phytocoris viridipennis* DAHLB., Vet. Ak. Handl. 1850, p. 212

Var. β.: Capite, pronoto antice scutelloque basi vel toto virescenti-flavis vel flavescentibus.

Var. γ.: Hemelytris maculis flavis omnibus fere evanescentibus.

Syn.: *Litosoma prasina* DOUGL. et Sc., Br. Hem. 344, 11, nec FIEB.

Hab. in *Chenopodiaceis*: Lapponia — Italia; Gallia — Turkestan.

Descr.: Corpus oblongum (♂) vel ovatum (♀), virescens, supra longius nigro-pilosum et hic illic pilis albis vel argenteis sub-maculatim tomentosum, tomento faciliter divellendo, subtus longius albido-pubescent. Caput pronoti basi circiter $\frac{2}{5}$ — in femina interdum tantum $\frac{1}{3}$ angustius, vertice oculo circiter $\frac{2}{3}$ — fere duplo (♂) vel paullo magis quam duplo — duplo et dimidio (♀) latiore, postice distinctius (♂) vel obsolete (♀) marginato; structura capitis *O. Fieberi* sat similis. Oculi fusci. Rostrum apicem coxarum intermediarum attingens vel paullulum superans, virescens, apice nigro. Antennae virescentes, apicem versus testaceae, articulo primo capite circiter $\frac{2}{5}$ (♂) vel duplo (♀) brevior, secundo hoc quadruplo vel magis quam quadruplo longior et pronot latitudine basali $\frac{1}{3}$ — fere $\frac{3}{7}$ (♂) vel hac tantum parum — paullulum longior, tertio secundo circiter $\frac{1}{7}$ — $\frac{1}{8}$ brevior et quarto circiter duplo longior. Pronotum basi longitudine duplo — magis quam duplo latius, apice longitudini aequale latum vel hac paululum latius; disco apicem versus leviter declivi, callis discretis, saepe flavescentibus; lateribus margine tenui. Scutellum virescens, saepe basi vel totum flavescent. Hemelytra abdomen longe (♂) vel parum (♀) superantia, saturate viridia, maculis flavis adspersis, his interdum evanescentibus; membrana leviter fumata, venis areolisque saturate viridibus, areola majore saepe basi magis minusve late hyalina; saepe hemelytra cum areolis membranae post mortem pallescentia, obsolete virescentia. Pedes virescentes, articulo ultimo tarsorum apice fusciscent, tarsis posticis articulo secundo tertio longitudine aequali. Segmentum maris genitale parvum. Terebra feminae circiter medium ventris attingens.

20. *Orthotylus alaiensis* REUT.

Diagn.: Oblongus virescens, opaculus, dense nigro-pilosus, pilis tomentosis albis parce immixtis, infra subtiliter albido-pubescent, antennis pallide