

testaceis, articulo primo dimidio capite paullulum longiore, tertio secundo longitudine aequali, quarto tertio fere quadruplo breviore; rostro apicem coxarum posticarum attingente; membrana subhyalina, areolis concoloribus, venis virescentibus; tibiis spinulis longioribus nigris; capite feminae basi pronoti $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{3}$ angustiore, vertice haud carinato; pronoto lateribus sinuato; tarsis posticis longis tibiis vix triplo brevioribus, articulo secundo tertio sat multo longiore. Long. ♀ $4\frac{1}{2}$ mm.

Hab. in Turkestan (Alai!), D. FEDTSCHENKO.

Descr.: Ab *O. turanico* REUT. corpore majore, magis oblongo, structura antennarum, rostri et pronoti mox distinguendus. Ab *O. marginali* REUT. corpore minore, supra nigro-piloso et ab *O. flavinervis* KIRSCHB. pilositate venisque aliter coloratis etc. divergens. Corpus virescens, opaculum, supra sat dense breviusque nigro-pilosulum, pilis albis tomentosis parum immixtis. Caput (♀) vix transversum, pronoti basi circiter $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{3}$ angustius, nutans, a latere visum altitudine longius, vertice immarginato oculo duplo latiore, clypeo basi in linea inter bases antennarum ducta posita, sub-perpendiculari, loris macula apicali ochracea. Oculi sordide virescentes. Rostrum apicem coxarum posticarum attingens, dimidio basali virescens, dimidio apicali testaceum, apice nigro-piceo. Antennae corpore cum hemelytris circiter $\frac{1}{4}$ breviores, testaceae, articulo primo capite circiter $\frac{2}{5}$ breviore, secundo hoc paullo magis quam triplo longiore, tertio secundo longitudine aequali, quarto primo fere breviore et tertio fere quadruplo breviore. Pronotum (♀) apice longitudini latitudine aequale, latitudine basali tantum $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ brevius, lateribus sat sinuatis, callis discretis. Hemelytra lateribus subparallelis, membrana fere hyalina, areolis concoloribus, venis virescentibus. Pedes virescentes, tibiis apicem versus tarsisque testaceis, illis longius et densius nigro-spinulosis; tarsis posticis longis, tibiis vix triplo brevioribus, articulo secundo tertio sat multo longiore. Terebra feminae medium ventris superans, squama basali angusta, acuminata.

21. *Orthotylus turanicus* REUT.

Diagn.: Obscurius et saturate viridis, opaculus, superne dense longiusque nigro-pilosus, pilis tomentosis albis densius immixtis, inferne albido-pubescentes; antennis virescentibus, apicem versus testaceis, articulo primo capite paulo minus quam duplo breviore, tertio secundo fere $\frac{1}{4}$ breviore et quarto circiter duplo et dimidio longiore; rostro apicem mesosterni subsuperante; tibiis nigro-spinulosis; membrana sub-hyalina; venis saturate viridibus; capite feminae pronoto $\frac{2}{5}$ angustiore, vertice immarginato; pronoti lateribus rectis. Long. ♀ $3\frac{2}{3}$ mm.

Hab. in Turkestan (Alai!, Isphairam!), D. FEDTSCHENKO.

Descr.: *O. virescenti* DOUGL. et Sc. statura coloreque similis, colore venarum membranae sub-hyalinae mox distinctus. Corpus supra obscure et saturate viride, ope-