

culum, longius et dense nigro-pilosum, pilis brevibus tomentosus albis densius immixtis, infra pallidius virescens, subtiliter albido-pubescentis. Caput fortiter nutans, colore saepe in testaceum nonnihil vergente, pronoti basi circiter $\frac{2}{5}$ angustius, vertice immarginato, oculo circiter duplo et dimidio latiore, clypeo basi in linea inter bases antennarum ducta posita, perpendiculari. Oculi virescentes. Rostrum sat robustum, apicem mesosterni attingens, virescens, articulo ultimo piceo. Antennae corpore cum hemielytris circiter $\frac{2}{5}$ breviores, virescentes, apicem versus testaceae, articulo primo capite circiter $\frac{2}{5}$ brevior, secundo hoc circiter $3\frac{1}{2}$ longiore, duobus ultimis simul sumtis secundo paullulum longioribus, tertio secundo fere $\frac{1}{4}$ brevior, quarto primo longitudine aequali et tertio circiter $\frac{4}{7}$ brevior. Pronotum trapeziforme, apice longitudini aequale latum, basi longitudine duplo latius (♀), lateribus rectis, margine sat tereti, callis disci bene discretis, saepe colore nonnihil in testaceum vergentibus. Hemielytra (♀) lateribus leviter rotundata, abdomen sat longe superantia, membrana sub-hyalina, areolis concoloribus, venis viridibus. Pedes virescentes tibiis nigro-spinulosis, apice earum tarsisque testaceis, articulo ultimo fusco. Terebra feminae ventris medium haud superans, squama basali sub-aequelateraliter triangulari.

22. *Orthotylus Oschanini* REUT.

Diagn.: Sat obscure viridis, nitidulus, superne longius nigro-pilosus, pilis brevibus intricatis albis immixtis, inferne albido-pubescentis; antennis articulo primo capite fere duplo brevior, tertio secundo fere $\frac{1}{3}$ brevior et quarto circiter duplo longior, rostro coxas posticas paullo superante; tibiis longius nigro-spinulosis; membrana subhyalina, venis dilute virescentibus; vertice maris distincte marginato; pronoti lateribus levissime sub-sinuatis. Long. ♂ $4\frac{3}{4}$ mm.

Hab. in Turkestan!, comm. D. OSCHANIN.

Descr.: Ab *O. alaiensi* REUT. corpore minus valido, pedibus multo gracilioribus, tarsis brevioribus et tenuioribus, antennis aliter constructis divergens; ab *O. turanico* REUT. rostro multo longiore distinctus videtur; ab *O. Artemisiae* J. SAHLB. etiam longitudine rostri, structura pronoti, pedibus gracilioribus, tarsis tenuioribus et brevioribus structuraque genitalium, ab omnibus tribus corpore superne nitidulo distinguendus. Corpus saturate sat obscure virescens, superne sat nitidum, longius densiusque nigro-pilosum, parcius albido-tomentosum. Caput (♂) pronoti basi fere duplo angustius, a latere visum altitudine basali sat multo brevius, clypeo basi in linea inter scrobes antennarum ducta posito, verticali, vertice distincte sed sat tenuiter marginato, oculo fere duplo latiore. Oculi (post mortem?) fuscii. Rostrum coxas posticas paullo superans, virescens, versus apicem ferrugineum, apice nigro. Antennae fusco-pubescentes, (♂) in linea media partis oculorum inferioris interne insertae, articulo primo capite fere duplo brevior, secundo primo fere quituplo longior, tertio secundo fere triplo brevior et quarto circiter duplo longior. Pronotum basi longitudine paullo minus quam duplo latius, lateribus levissime sinuatis, callis disci bene discretis. Hemielytra (♂) abdomen longe superantia, membrana levissime fumata, areolis maculaque parva ad apicem cunei hyalinis,