

*Hab.* in Biskra! Algeriae, DD. LETHIERRY et PUTON; Rossia meridionalis (Astrachan!), D. JAKOVLEFF.

Species praecedentibus minor; a *T. punctipede* REUT. fronte convexiore, vertice latiore, punctis tibiaram minoribus corporeque multo minore distincta; a *T. unicolore* corpore minore, capite minus lato, pronoto antice magis angustato, antennis articulo secundo brevioribusque punctis nigris bene distinctis mox distinguenda.

### Tuonia unicolor SCOTT.

*Diagn.*: Virescens; capite (♀) a tergo viso pronoto aequo longo ejusque basi circiter solum  $\frac{1}{5}$  angustiore, fronte transversim valde convexa, vertice oculo circiter triplo latiore; rostro coxas posticas attingente; antennis (♀) articulo secundo latitudini basali pronoti longitudine aequali, tertio secundo circiter  $\frac{1}{5}$  brevioribus; pronoto valde transverso, apice longitudine fere duplo latiore et basi vix magis quam  $\frac{1}{6}$  angustiore; hemielytris corio lateribus medio, clavo medio cuneoque basi albidis, membrana fumata, macula hyalina ad apicem cunei apicem areolae minoris attingente, stria pone hanc maculam areolae minore nigricantibus; tibiis albidis, punctis nigris destitutis, sed spinis longis validiusculis nigris armatis. Long. ♀ 2—2 $\frac{2}{5}$  mm.

*Syn.*: Hem. Gymn. I, 26, 10!

*Hab.* in Gallia meridionali (Toulouse?), D. Dr. PUTON; Corsica!, D. SCOTT.

A *T. concinna* REUT. articulo secundo antennarum longiore, pronoto fortius transverso versus apicem levissime angustato tibiisque inpunctatis bene distincta; a *T. hippophaes* (MEY.) FIEB. et *prasina* FIEB. capite multo latiore pronotoque versus apicem multo minus angustato mox distinguenda.

*Maurodactylus nigricornis* (JAKOVL.) REUT., p. 29, 2. *Mas* hujus speciei est *M. bicolor* FIEB., REUT., p. 31, 4.

Lin. 1, infra, adde: Caucasus, D. BALASSOGLO. Habitat in *Sisymbrio sophia* (JAKOVLEFF).

*Maurodactylus bicolor* (FIEB.) REUT., p. 31, 4 = *mas M. nigricornis* JAKOVL., REUT., p. 29, 2. Specimina *M. bicoloris* hispanica forsitan marem *M. alutacei* FIEB. representant.

*Asciodema Fieberi* DOUGL. et SC., p. 35, lin. 12, infra, legitur: totus, lege: totum. Infra genus *Asciodema* p. 37, adde:

### Genus DAMIOSCEA REUT.

*Diagn.*: Corpus (♂) oblongum, superne nigro-pilosum, capite fortius nutante, sat transverso, vertice aequali, clypeo declivi levius sed distincte prominente, basi