

*Hab.* in Georgia (Derbent!), D. KOMAROFF.

*Descr.*: Corpus maris oblongum, parallelum. Caput basi pronoti circiter  $\frac{2}{5}$  angustius, testaceum, subtilissime pallido-pubescentis, ipso apice clypei nigro-fusco, vertice maris oculo  $\frac{1}{3}$  latiore. Oculi fusco-nigri, maris prominentes convexi. Rostrum pallidum, apice nigro. Antennae fuscae, articulo primo toto secundoque basi nigris. Pronotum et scutellum nonnihil virescentia, in cervino-testaceum vergentia, dense nigro-pubescentia, basi scutelli testaceo-flava, omnium subtilissime flavo-pubescente. Hemielytra testaceo-cervina, longius dense nigro-pubescentia, tota unicolora, membrana leviter fumata, iridescente, venis testaceis, areolis haud iridescentibus. Pectus et abdomen virescentia. Femora colore corporis. Tibiae et tarsi testacei, illae punctis nullis, sed spinulis nigris mediocribus.

*Paredrocoris pectoralis* REUT., p. 37, lin. 18, infra, *adde*: Hungaria (Farkasd!), D. Dr. v. HORVATH.

*Tragiscocoris Fieberi* (MEY.) FIEB., p. 39, lin. 3, supra, *adde*: Tunisia, D. DORIA (Mus. Gen.). — Lin. 12, infra, *legitur*: paullo minus quam  $\frac{2}{3}$ , *lege*: paullo magis quam  $\frac{1}{3}$  vel fere dimidio brevior.

*Auchenocrepis Reuteri* JAKOVL., p. 41, lin. 20, supra, *adde*: Georgia (Derbent), D. KOMAROFF.

*Sthenarus dissimilis* REUT., p. 174, lin. 12, infra, *adde*: Hungaria (Bartfa!), D. Dr. v. HORVATH.

*Sthenarus modestus* MEY., p. 44, lin. 7, supra, *adde*: Herzegovina, D. Dr. HORVATH.

Infra descriptionem hujus speciei *adde*:

### *Sthenarus syriacus* REUT.

*Diagn.*: Ovatus, niger vel purpurascens-niger, nitidus, subtiliter griseo-pubescentis; capite cum oculis picescenti-rufescentis; antennis pedibusque subaurantiacis, illis articulo secundo latitudine capitis circiter  $\frac{1}{3}$  longiore, ultimis fuscis sat robustis (♀), femoribus versus basin fuscis, tibiis versus apicem pallescentibus, nigro-spinulosis, sed punctis nigris destitutis; tarsis basi et apice fuscescentibus. Long. ♀  $3\frac{1}{3}$  mm.

*Hab.* in Syria (Zebodani!), comm. D. Dr. PUTON.\*

*Descr.*: *Sth. modesto* MEY. multo major, antennis pedibusque fere aurantiacis, illis crassioribus, articulo secundo longiore, ultimis fuscis, macula hyalina membranae ad apicem cunei majore nec non colore capitis bene distincta. A *Sth. ocellari* MULS. et REY, cui statura et magnitudine similis, tibiis punctis nigris totis destitutis, articulis ultimis antennarum fuscis mox distinguendus. Corpus ovatum, nigrum vel purpurascens-nigrum, nitidum, subtiliter griseo-pubescentis (squamulae metallica in specimine divulsae).

\* A me in Berl. Ent. Zeitschr. XXV, p. 194 nomine *Sth. ocellaris* false enumeratus.