

Mas.: articulo secundo antennarum crassiusculo nigro-fusco, versus apicem leviter pallescente; vertice oculo $1\frac{2}{5}$ latiore.

Var. β: Capite clypeo toto lorisque fusco-nigris, fronte fuscescente; callis pronoti ochraceis; scutello basi aurantiaco. ♂ ♀.

Lin. 11, supra, *adde*: Hispania!, D. LETHIERRY; Gallia meridionalis (Avignon!), D. Dr. PUTON. Tom. II, p. 300, lin. 13—9, *infra, delentur*. (In Hungaria non inventus).

Lin. 17, supra, *legitur*: Caput dimidio margine basali pronoti paullo latius, *adde*: vel fere $\frac{1}{3}$ angustius.

Infra hanc speciem *adde*:

Plagiognathus bipunctatus (JAKOVL.).

Diagn.: Gramineus vel post mortem glauco-virescens, superne nigro-pilosus; antennis maris et feminae totis pallide flaventibus vel articulo primo virescente; vertice maris et feminae oculo duplo latiore; membrana dilute grisecente, iridescente, venis albidis, puncto nigro-fusco mox infra apicem venae cubitalis; femoribus saltem posticis nigro-punctatis, tibiis nigro-spinulosis, spinulis solum tibiarum posticarum basalibus e punctis fuscis nascentibus, his punctis minutissimis, ipsa basi tibiarum posticarum fuscescente. Long. ♂ 3, ♀ $3\frac{2}{5}$ — $3\frac{1}{2}$ mm.

Syn.: *Psallus bipunctatus* JAKOVL. in litt.

Hab. in *Salvia aethiopis* (MAYR): Caucasus (Petrovsk!), D. JAKOVLEFF; Moravia!, comm. D. Dr. PUTON; Austria inferior (Wien!), D. Prof. MAYR; Hungaria! (D. Prof. MAYR; Ujhely!, Pest!, D. Dr. v. HORVATH).

Descr.: A *Pl. alpino* REUT. statura minore membranaque ad apicem venae cubitalis puncto distinctissimo nigro signata, a *Pl. fuscilori* REUT. et *Chrysanthemi* WOLFF (*viridulo* FALL.) colore antennarum tibiisque multo subtilius nigro-punctatis, anterioribus totis, posticis versus apicem late impunctatis mox distinctus. Corpus oblongum, parallelum (♂) vel ovatum (♀), gramineum vel post mortem pallide glaucescenti-virescens, saepe pallescens, superne nigro-pilosum. Caput basi pronoti fere duplo angustius, unicolor, vertice oculo duplo latiore (♂ ♀). Oculi fusi. Rostrum coxas posticas attinens, versus apicem testaceum, apice piceo-nigrum. Antennae corpore cum hemielytris circiter $\frac{2}{5}$ breviore, pallidissime virescentes, totae unicolores, secundo latitudine basali pronoti parum vel paullulum breviore, duobus ultimis simul sumitis secundo paullo longioribus, quarto tertio paullo minus quam duplo breviore. Pronotum basi longitudine duplo latius. Hemielytra unicolora; membrana sub-hyalina, venis albidis, puncto nigro ad apicem venae cubitalis distinctissimo. Pedes colore corporis, femoribus posticis superne ante apicem atomis nonnullis fuscis, posterioribus inferne biseriatim minute fusco-punctatis, punctis tamen ad marginem superiorem femorum posticorum magnis; tibiis