

aussi : « die vier hinteren Schienen in der Mitte mehr braun. » La couleur de tous les tibias est brune dans la figure 438. L'espèce de Herrich-Schaeffer vient de Portugal. Le *Pach. Putoni* Saund. (décrit de l'Algérie, mais trouvé aussi à Coimbra par M. Paulino d'Oliveira, d'après M. Puton, *Revue d'Ent.*, 1884, p. 147), doit donc prendre le nom de *pineti* H. Sch. Quant à l'espèce connue aujourd'hui sous ce dernier nom, je propose celui de *confusus* (1). Peut-être elle est identique au *Cimex triguttatus* Fabr. (*nec* Linn.); mais ce fait me paraît douteux et d'ailleurs le nom est appliqué à cette espèce par erreur, le *Cim. triguttatus* Linné, cité par Fabricius, étant un tout autre insecte (*Systemonotus*).

3. *Phytocoris scriptus* Kol., *Melet. Entom.*, II, p. 115, n'est pas l'espèce de Fabricius, *Brachycoleus scriptus*, mais le *Brachycoleus Steini* Reut., ce qui résulte des caractères suivants : « Vitta externa [hemelytrorum] cum media in area corii jam confluenti apice sub angulo fere recto extrorsum flexa et in fasciam transversam dilatata... Appendicis apex niger. »

4. *Phytocoris clavatus* Burm., *Handb.*, II, p. 266, 1, est, d'après le texte, synonyme de *Pilophorus perplexus* Dougl. et Sc. Burmeister dit : « elytris fusco-ferrugineis, ... fasciis duabus angustis albis, prima interrupta », et plus bas, p. 267 : « Auf *Ribes rubrum* häufig. » Chez le *P. clavatus* L., la seconde strie est aussi interrompue. Le texte ne peut pas se rapporter au *P. cinnamopteris* Kirschb., qui vit sur les pins. Les exemplaires, trouvés sur les pommiers et indiqués par Meyer-Dür sous le nom de *Capsus clavatus* (*Rhynch. Schweiz*, p. 88 : « Fast zimmtbraune Exemplare findet man um die Mitte Juli auf kleinen Aepfelbaumen), appartiennent aussi au *perplexus* ou peut-être plutôt au *pusillus* Reut. Le *Globiceps clavatus* Costa (*Cim. Regn. Neap.*, III, p. 47) paraît aussi en partie (var. *a*) être synonyme de ce dernier. *Phytoc. clavatus* Hahn est, comme je l'ai publié déjà, le *Piloph. confusus* Kirschb.

5. Dans les *Materiali per lo Studio della Fauna Tunisina*, V, *Rincoti*, p. 46 (482), M. Ferrari a décrit une espèce du genre *Systemonotus* comme *albofasciatus*? Lucas, montrant les différences entre l'espèce décrite par Lucas de l'Algérie et l'espèce tuni-

(1) Je considère les *P. pineti* et *confusus* Reut. comme deux formes d'une même espèce, analogues aux variétés du *pedestris* Pr. Je possède en effet deux exemplaires d'Algérie, dont l'un, de Daya, est bien conforme aux descriptions de Saunders et Herrich-Schaeffer, c'est-à-dire à la bande noire aux élytres et la bordure latérale blanche du pronotum entière; tandis que l'autre, de Teniet-el-Had, ressemble au *confusus* Reut., dont on peut faire une variété *nigripes*, parce qu'il a les pattes et les 2^e et 3^e articles des antennes entièrement noirs comme dans le *pineti* H.-S. N'ayant plus sous les yeux l'exemplaire de Coimbra, je ne puis rien en dire.