

NOTES SYNONYMIQUES

Par O. M. REUTER.

1. Dans la *Revue d'Entomologie*, 1885, p. 222 sqq., j'ai décrit trois espèces du genre *Pachymerus*, sous-genre *Microtomideus* mihi, indiquant comme nouvelles deux de ces espèces, *P. (M.) moerens* et *dasyncnemis*. J'ai cependant oublié d'étudier la description du *Pachymerus carbonarius* Rambur (*Faune de l'Andalousie*, p. 148), me confiant à M. le Dr Puton, qui, dans son *Catalogue des Hémipt. d'Europe*, a identifié cette espèce avec le *leucoderma* Fieber. Mais examinant de plus près la description susdite, je trouve qu'elle se rapporte à ma nouvelle espèce de l'Algérie (*dasyncnemis*). Il me suffit de citer les mots de Rambur : « breviter subtomentosus » et « pedibus tomentosus », ainsi que « membrana fuscescens ». Rambur, connaissant le *Cimex carbonarius* Rossi, synonyme de *Microtoma (Pachymerus in Rambur) atrata* Goetze (*aterrimus* Fabr. in Rambur), décrit son *Pachymerus carbonarius* comme une espèce nouvelle et pour ce motif le nom, donné par lui, restera pour mon *P. (M.) dasyncnemis*.

2. Tous les auteurs plus récents ont appliqué, comme le fait aussi Fieber, le nom de *Pachymerus (Rhyparochromus in Fieber) pineti* H. Sch., à une espèce bien distincte du vrai *pineti* de Herrich-Schaeffer. Je les ai suivis aussi dans la *Revue d'Entom.*, p. 228. La description et la figure données par Herrich-Schaeffer (*Die Wanzenartigen Insecten*, IV, p. 95. fig. 438) indiquent cependant, sans doute, que l'espèce de Herrich-Schaeffer est identique avec le *Pachymerus Putoni* E. Saunders (*Entom. Monthl. Mag.*, XII, p. 221, *Calyptonotus*). Voici la description de Herrich-Schaeffer : « Schwarz, die Spitze der ersten und zweiten Fühlergliedes schmal, die Wurzel des vierten breit weisslich; die Seiten und der Hinterrand des Thorax breit gelbweiss, in jeder Hinterecke ein schwarzer Fleck. Auf den blassen Decken mehrere Linien aus Punkten und ein schwarzer Streif, welcher von dem Fleck an der Kreuzung gegen die Wurzel hin läuft. Membran schwarz, mit grosser weisser Spitze. » Plus bas, Herrich-Schaeffer décrit les tibias et les tarses jaunâtres (die Schienen und Tarsen gelblich), tandis que le type de Saunders a les pieds postérieurs noirâtres et les pieds antérieurs brunâtres; les genoux seulement sont jaunâtres, mais cette couleur peut certainement varier et Herrich-Schaeffer dit

aussi : « die vier hinteren Schienen in der Mitte mehr braun. » La couleur de tous les tibias est brune dans la figure 438. L'espèce de Herrich-Schaeffer vient de Portugal. Le *Pach. Putoni* Saund. (décrit de l'Algérie, mais trouvé aussi à Coimbra par M. Paulino d'Oliveira, d'après M. Puton, *Revue d'Ent.*, 1884, p. 147), doit donc prendre le nom de *pineti* H. Sch. Quant à l'espèce connue aujourd'hui sous ce dernier nom, je propose celui de *confusus* (1). Peut-être elle est identique au *Cimex triguttatus* Fabr. (*nec* Linn.); mais ce fait me paraît douteux et d'ailleurs le nom est appliqué à cette espèce par erreur, le *Cim. triguttatus* Linné, cité par Fabricius, étant un tout autre insecte (*Systellonotus*).

3. *Phytocoris scriptus* Kol., *Melet. Entom.*, II, p. 115, n'est pas l'espèce de Fabricius, *Brachycoleus scriptus*, mais le *Brachycoleus Steini* Reut., ce qui résulte des caractères suivants : « *Vitta externa [hemelytrorum] cum media in area corii jam confluenti apice sub angulo fere recto extrorsum flexa et in fasciam transversam dilatata... Appendicis apex niger.* »

4. *Phytocoris clavatus* Burm., *Handb.*, II, p. 266, 1, est, d'après le texte, synonyme de *Pilophorus perplexus* Dougl. et Sc. Burmeister dit : « *elytris fusco-ferrugineis, ... fasciis duabus angustis albis, prima interrupta* », et plus bas, p. 267 : « *Auf Ribes rubrum häufig.* » Chez le *P. clavatus* L., la seconde strie est aussi interrompue. Le texte ne peut pas se rapporter au *P. cinnamopteris* Kirschb., qui vit sur les pins. Les exemplaires, trouvés sur les pomiers et indiqués par Meyer-Dür sous le nom de *Capsus clavatus* (*Rhynch. Schweiz*, p. 88 : « *Fast zimmtbraune Exemplare findet man um die Mitte Juli auf kleinen Aepfelhaumen* »), appartiennent aussi au *perplexus* ou peut-être plutôt au *pusillus* Reut. Le *Globiceps clavatus* Costa (*Cim. Regn. Neap.*, III, p. 47) paraît aussi en partie (var. *a*) être synonyme de ce dernier. *Phytoc. clavatus* Hahn est, comme je l'ai publié déjà, le *Piloph. confusus* Kirschb.

5. Dans les *Materiali per lo Studio della Fauna Tunisina*, V, *Rincoti*, p. 46 (482), M. Ferrari a décrit une espèce du genre *Systellonotus* comme *albofasciatus*? Lucas, montrant les différences entre l'espèce décrite par Lucas de l'Algérie et l'espèce tuni-

(1) Je considère les *P. pineti* et *confusus* Reut. comme deux formes d'une même espèce, analogues aux variétés du *pedestris* Pz. Je possède en effet deux exemplaires d'Algérie, dont l'un, de Daya, est bien conforme aux descriptions de Saunders et Herrich-Schaeffer, c'est-à-dire à la bande noire aux élytres et la bordure latérale blanche du pronotum entière; tandis que l'autre, de Teniet-el-Had, ressemble au *confusus* Reut., dont on peut faire une variété *nigripes*, parce qu'il a les pattes et les 2^e et 3^e articles des antennes entièrement noirs comme dans le *pineti* H.-S. N'ayant plus sous les yeux l'exemplaire de Coimbra, je ne puis rien en dire.

sienne. J'ai comparé la description et la figure de la première espèce avec la description complète, faite par moi d'après le type de M. Ferrari, et je trouve que celui-ci est bien distinct par la tête plus prolongée, la structure des antennes assez différente (le second article trois fois plus long que le premier, qui est à peine plus long que la tête entre le bord antérieur des yeux et le sommet du clypeus) et enfin par les taches blanches des élytres (« *hemelytra fusco-nigra fasciis duabus niveis ornata, altera lata mox ante medium corii in marginem hemelytrorum exteriorem extensa et interne cum fascia clavi media tota confluenta, fasciam unicum formante, hac fascia margine superiore obliqua, inferiore transversa in parte clavi sinuata, interiori quam exteriori duplo angustiore; fascia altera corii apicali transverso-ovali, acumine in angulo corii interiore posito* » Reut. mss.). Cette espèce doit donc être nommée *Micelii*, comme le propose M. Ferrari, p. 48 (484).

6. Le *Phytocoris albo-fasciatus* Lucas, *Explor. de l'Algér.*, *Artic.*, III, p. 83, 114, pl. III, f. 6, est identifié par M. Puton (*Catal. Hém. d'Eur.*) avec le *Systellonotus triguttatus* Linn., mais je doute que cette identification soit juste. L'espèce de l'Algérie est bien plus grande (6 mill.), la structure des antennes paraît (d'après la figure) un peu différente et le troisième article de celles-ci est largement blanc à la base; les taches des élytres sont bien également formées comme chez le *triguttatus*, mais la couleur des élytres mêmes est plus foncée, d'un « noir teinté de grisâtre; » enfin le rostrum et les pieds sont noirs.

7. Dans l'*Entomological Magazine*, I, p. 197 et 198 (1833), Curtis a créé le genre *Chlamydatus* pour le *Chl. marginatus* Curt. n. sp. Cette espèce est identique avec l'*Agalliastes saltitans* (Fall.). Le genre *Agalliastes* Fieb. (1859) doit à cause de cela être nommé *Chlamydatus*. Le *Chlam. ochripes* Curt. (= *Mecomma ambulans* (Fall.)) est décrit plus tard (1838) dans le *British Entomol.*, XV, p. 694. L'espèce décrite quand le genre fut fondé restera comme type du genre.