

dall'*angusticonus* n. sp. per essere alquanto più largo posteriormente ed avere le gambe interamente gialle, la quale particolarità lo fa riconoscere a prima giunta. Inoltre presenta tutti i femori alquanto allargati ed arcuati; il mento è interamente piano e lucente.

Wernsdorf 30 giugno 1888.

A. KUWERT.

DESCRIPTIO

SPECIEI NOVA SICILIANAE GENERIS PLAGIOGNATHUS

(Hemiptera, Capsidae)

AUCTORE

O. M. REUTER

Plagiognathus tomentosus, n. sp.

Nigro-fuscus, olivaceus, unicolor, superne longe et dense albo-tomentosus, pilis nigris destitutus; cuneo basi concolore; membrana aequaliter nigricante; antennis femoribusque fusco-nigris, articulis ultimis antennarum, tibiis tarsisque obscure fuscis, tibiis basi punctioque ad basin spinularum fusco-nigris. Long. ♂ 2 3/4 mm.

Sicilia, unicum marem invenit Cel. D. Ragusa.

Plag. olivaceo Reut. magnitudine coloreque similis, mox autem pubescentia longa tomentosa alba distinguendus. — *Pl. albipenni* Fall. affinis, differt tamen cuneo toto concolore tibiisque fuscis. Corpus fusco-nigrum, superne olivaceo-micans, dense et longe albo tomentosum. Caput (♂) basi pronoti ab antico viso fere 1/3 angustius, latitudini frontis oculique singuli longitudine subaequale, fusco-nigrum, unicolor, fronte convexa, vertice oculo saltem duplo latiore. Rostrum fuscum. Antennae nigro-fuscae, articulis ultimis obscure fuscis, secundo (♂) latitudini basali pronoti aequae longo. Pronotum (♂) basi longitudine duplo latius, apice basi circiter 1/3 angustius. Hemielytra tota unicolore, membrana cum venis aequaliter nigricante. Femora fusco-nigra. Tibiae cum tarsis obscure fuscae, basi punctioque ad basin spinularum fusco-nigris, his punctis tamen parum distinguendis.