

## CAPSIDÆ NOVÆ E ROSSIA MERIDIONALI

DESCRIPTÆ

Ab O.-M. REUTER.

---

### 1. *Plagiorrhama concolor* n. sp.

Elongatus, ferrugineus, opacus, pallido-pubescens, capite, pronoto, scutello hemielytrisque longe remote fusco-pilosis; apice scutelli, hemielytris, antennis, rostro pedibusque dilutioribus, flavo-testaceis, hemielytris unicoloribus abdomineque leviter nitidulis. — Long. formæ brachypt., 3  $\frac{2}{5}$  mill.

Caucasus, Petrovsk, unicum spec., D. Jakowleff.

Caput formæ brachypteræ basi pronoti circiter  $\frac{1}{5}$  angustius, vertice convexiusculo oculo triplo latiore (♀). Rostrum coxas posticas paullulum superans. Antennæ articulo 2<sup>o</sup>, 1<sup>o</sup> paullo magis quam triplo longiore: Pronotum (brach.) apice quam basi solum  $\frac{1}{4}$  angustius, lateribus postice levius sinuatis. Hemelytra (brach.) basin segmenti quarti dorsalis parum superantia, apice divaricatim rotundata, membrana angustissime lineari.

### 2. *Platyporus* nov. gen.

πλατύς. πόρευώ.

Corpus formæ brachypteræ late ovatum, superne deplanatum, inferne ut etiam pronoto, scutello, hemielytris connexivoque pilis squamiformibus pallidis vestitum. setis destitutum; capite lato verticali, antico viso quinquangulari, infra oculos longe producto, latitudine cum oculis æque longo, a latere viso altitudine multo brevior, vertice subhorizontali, subplano, margine levissime arcuato, disco utrinque puncto lævi concolore instructo, medio striis longitudinalibus in frontem productis ibique divergentibus, fronte basi late depressa, cetero tumido-convexa, clypeo depresso a fronte bene discreto, perpendiculari vel retrorsum nonnihil vergente, ipsa basi sat longe infra lineam inter scrobes antennarum ductam posita, genis altissimis; oculis brevibus, basi retrorsum vergentibus; antennis sat longis, articulo primo interne setis rigidis instructo, oculi