

latitudinē multo longiore, apicem clypei haud superante, secundo lineari, capitis latitudinē cum oculis multo longiore; pronoto f. brach. basi subtruncato; scutello f. brach. toto plano, basi obtecta; hemielytris f. brach. totis coriaceis, cuneo haud discreto; femoribus posticis longis, valde incrassatis, margine antico setula unica instructis, tibiis omnibus cylindricis, anticis reliquis haud crassioribus, rectis; tarsis posticis articulo secundo tertio vix longiore.

A gen. *Euryopocoris* Reut. (typ. : *nitidus* Mey.), cui proximus videtur, corpore deplanato, pilis squamiformibus instructo, vertice subhorizontali, antennis articulo primo externe femoribusque posticis antice setis rigidis destitutis, tibiis cylindricis, reliquis haud crassioribus, a gen. *Anapus* Stål (typ. : *Kirschbaumi* Stål) vertice margine postico arcuato, oculis basi retrorsum vergentibus, articulo antennarum primo externe femoribusque posticis antice setis rigidis destitutis, a gen. *Orthocephalus* Fieb. Reut. (typ. : *mutabilis* Fall), fronte tumido, clypeo a fronte bene discreto, oculis basi retrorsum vergentibus, antennis longius infra oculos insertis, articulo primo interne multisetoso, scutello f. brach. basi obtecta, hemielytris f. brach. cuneo haud discreto, tarsis articulo secundo tertio vix longiore corporeque deplanato haud setoso divergens.

Pl. dorsalis n. sp.

Niger, opaculus, capite nitido, dorso abdominis lævi subviolaceo-ænescenti, pronoto, scutello, hemielytris, connexivo lato, pectore ventreque pilis squamiformibus albidis facillime divellendis parcius vestitis; vertice marginibus orbitalibus obscure testaceis; tibiis flavotestaceis, nigropubescentibus, breviter nigrospinulosis, basi et apice nigris; hemielytris (♀ brach.) solum segmentum basalem abdominis tegentibus, apicem versus longitudinaliter substrigosis, angulo externo late rotundatis, margine apicali levissime rotundato versus commissuram nonnihil obliquatis. — Long., ♀ brach. 3 3/4 mill.

Transcaucasia, Kasikoparan, unicum specimen communicavit D. Dr Horvath.

Caput basi pronoti nonnihil angustius, vertice oculo fere triplo latiore. Antennæ articulo 1° latitudinē interoculari circiter 1/4 breviorē; 2° 1° circiter 2 1/3 longiorē. Pronotum basi longitudinē paullo magis quam duplo latius, disco planum, subtiliter coriaceum, ante medium utrinque foveola instructum. Scutellum pronoto 1/3 brevius, subtiliter coriaceum. Hemielytra commissura pronoti longitudinē. Acetabularum margines tenuiter albidī. Abdomen valde