

CAPSIDÆ NOVÆ EX AFRICA BOREALI.

Descriptis O.-M. REUTER.

1. *Lygus fuscus* n. sp.

Fuscus, superne leviter nitidus, superne capite scutelloque exceptis sat fortiter et remote punctatus, inferne fortius nitidus, margine postico pronoti, clavo medio, apice scutelli, rostro, antennis, pedibus orificiisque metastethii pallide lurido-flaventibus, antennarum articulo secundo versus apicem, rostro dimidio apicali, femoribus annulis duobus ante apicem, tibiis annulis tribus tarsisque fuscescentibus; capite fusco striato et lineolato, vertice (σ) oculo magno nigro-piceo fere duplo augustiore, postice tenuissime marginato; rostro coxas posticas paullo superante; tibiis punctis destitutis, anticis submuticis, posterioribus fuscescenti-spinulosis. —Long., σ , 5 mill.

Ægyptus, Siout; unicum specimen misit D. Prof. Costa (Mus. Neapolitanum).

Caput basi pronoti fere triplo angustius, pallide lurido-flavens, sat nitidum, læve, fronte utrinque striis sex transversalibus, clypeo vittula basali, lineolis duabus mediis vittaque apicali. genis maculis nonnullis fuscis. Oculi nigro-picei altitudinem totam capitibus occupantes. Antennæ articulo secundo latitudine basali pronoti circiter $2/5$ brevioris, duobus ultimis fere æque longis, simul secundo paullo brevioribus. Pronotum trapeziforme, leviter convexum, basi longitudine vix duplo latius, callis exceptis sat remote sed versus latera densius impresso-punctatum, disco postice pallidius. Scutellum læve. Hemelytra sat remote impresso-punctata, punctis versus apicem corii cuneique minoribus, levius impressis; membrana fumata, basin versus cum areolis hyalinescente, venis luridis, brachiali versus apicem fuscescente. Pectus glabrum, epimeris prostethii fortiter punctatis. Venter nitidus, flavo-pubescens.

2. *Camptobrochis pallidus* n. sp.

Oblongo-ovalis, pallide flavens, pronoto hemielytrisque dense concoloriter punctatis, corio apicem versus cuneoque sublævibus,