

superne glaber, antennis pedibusque pilosulis, illis articulo secundo apice duobusque ultimis fuscis, tertio basi pallido, his femoribus anterioribus marginibus apicem versus, posticis annulis duobus antepicalibus magis minusve completis, tibiis margine superiore ultra medium apiceque fuscescenti-sanguineis, tarsis apice fuscis; capite et pronoto fusco-signatis; scutello fusco, lateribus pallidis; hemielytris macula subbasali cuneiformi inter venas, apice clavi vittam pallidam includente fascia obliqua apicali corii bis pallido-interrupta, angulis anteriore et apicali cunei venisque membranæ fuscis, hac basi cum areolis hyalina, dimidio apicali fumata. — Long., ♂, 4 1/2 mill.

Ægyptus, Jajoum; unicum marem communicavit D. Prof. Costa (Mus. Neapol.).

C. pilipedi Reut. statura signaturisque sat similis, corpore superne multo densius concoloriter punctato, vertice maris latiore, oculis ejus minus fortiter granulatis, pronoti lateribus, antennis tibiisque pilis longis exsertis destitutis signaturaque pedum bene distinctus. Caput læve, stramineum, macula verticis inæquali picea, striis frontis, lineis duabus clypei maculisque genarum ochraceis; vertice (♂) oculo latiore. Oculi magni, nigro-fusci. Rostrum coxas intermedias attingens, apice nigro-fusco. Antennæ (♂) articulo secundo lineari, latitudine basali pronoti paullo brevior, duobus ultimis simul 2° circiter 1/3 brevioribus. Pronotum dense concoloriter punctatum, callis parvulis, annulo collari stramineo, disco postico fuscescenti-maculato. Prostethium epimeris fuscescentibus punctatis, xypho lævi, marginato, stramineo. Mesosternum fuscum. Metastethium fuscum, area orificiorum straminea. Venter pallide flavens, molliter cano-pubescent, lateribus infuscatis. Femora inferne pilis nonnullis longis exsertis instructa. Tibiæ muticæ.

3. *Systellonotus Putoni* n. sp.

Mas elongatus, cum antennis et pedibus fusco-niger, unicolor; hemielytris nigro-fuscis, ima basi corii et clavi cuneoque nitidulis; corio fasciis duabus niveis, altera mox ante medium, altera apicali, illa latiore, interne et antice cum guttula parva clavi ad medium suturæ posita confluyente, capite pone oculos brevissimo; oculis exsertis; antennis articulo secundo versus apicem levissime incrassato, tertio secundo fere 1/5 brevior; pronoti basi annulo apicali duplo et dimidio latiore. — Long., 4 mill.

Tunisia, Mekalta; unicum marem misit D. Dr. Puton (Collectio Puton).