
IL NATURALISTA SICILIANO

CAPSIDAE SICILIANAE

novae et minus cognitae

DESCRIPSIT

O. M. REUTER

1. *Pithanus Ragusae* n. sp.

Niger, sat nitidus, glaber; antennis articulo primo apice, rostro pedibusque ferrugineis, rostri articulo primo apiceque piceis; femoribus seriatim piceo-punctatis velvittatis, femoribus posticis apice sat late tibiisque posticis basi piceis, apice tibiarum tarsisque fuscis; hemielytris limbo laterali basique usque ad suturam clavi stramineis, limbo flavo formae brachypterae interne late sinuato-arcuato, margine corii apicali oblique late rotundato-truncato, ejus dimidio interiore nigro. Long. ♀ macr. 5 $\frac{1}{2}$, brach. 4 $\frac{3}{4}$ mm.

A *P. Märkelii* H. S., cui colore antennarum similis, signatura hemielytrorum, corii margine apicali formae brachypterae truncato verticeque latiore distinctus; a *P. Marshalli* D. et Sc. antennarum etiam articulo secundo nigro-fusco, colore pedum dimidioque interiore marginis apicalis corii (f. brachypt.) concolore, nigro divergens. An hujus varietas? Corpus nigrum, sat nitidum, glabrum. Caput vertice oculo fere duplo latiore, utrinque striola ferruginea notatum. Rostrum coxas posticas attingens, articulo primo basi excepta apiceque piceis. Antennae nigropiceae, articulo primo fere dimidio apicali ferrugineo, tertio secundo aequalongo, quarto tertio fere magis quam duplo brevior. Pronotum f. *macropterae* basi longitudine nonnihil latius et capiti cum oculis aequelatum, apice capite oculis exceptis paullo latius, lateribus ultra medium parallelis, dein subito ampliatis, disco a basi versus anulum apicalem leviter declivi; f. *brachypterae* basi quam apice nonnihil angustius, vertice inter oculos paullo latius, longitudine angustius, lateribus medio leviter rotundatis, medio transversim convexiusculum, disco foveolis duabus anterioribus strigisque impressis duabus posterioribus divergentibus,