

basim versus magis attenuato cuneoque haud nigro-punctato divergere videtur. Antennae dimidio corpore (cum hemielytris) parum longiores, graciles; articulo primo externe fusco; secundo reliquis tribus longitudine subaequali, ad apicem modice incrassato, testaceo, apice fusco (vel sec. Costa (an maris?) nigro-fusco, in medio fulvo-testaceo); tertio et quarto filiformibus fusco-ferrugineis, tertio summa basi pallida, quarto tertio brevior. Pronotum crebre nigro-punctatum, livido-testaceum, annulo apicali flavo, callis laevibus aurantiacis, postice saepe nigro-cinctis; margine postico tenuiter flavescente. Scutellum punctatum, livido-testaceum, apice pallide flavo, macula basali saepe deficiente nigricante subcordata. Hemielytra crebre nigro-punctata, livido-testacea, commissura clavi, corii margine apicali maculaque exteriori supra basin cunei nigricantibus; cuneo aurantiaco, basi parce concoloriter, apicem versus obsolete punctato, punctis nigris destituto, apice anguloque basali interiore nigris; membrana basi hyalina, venis nigris, summa basi pallidis, postice fuliginosa. Pectus testaceo-ferrugineum, fusco variegatum. Abdomen fulvo-ferrugineum. Pedes fusco-nigri, femoribus superne annuloque incompleto ante apicem ferrugineis, tibiis annulis duobus completis pallidis. Variat sec. Costa femoribus ferrugineis, fusco-variegatis.

3. *Macrocoleus Ragusae* n. sp.

Vitellinus, superne dense et longius nigro-pilosus, subtiliter flavo-pubescentis, abdomine virescente, subtiliter pallido-pubescente; coxis anticis inferne pallido-setosis, femoribus inpunctatis, tibiis sat tenuiter nigro, spinulosis, tarsis apice fuscis; hemielytris unicoloribus, membrana dilute fumata, venis luteis, externe hyalino-cinctis, areolis nonnihil flavescens; capite (σ) cum oculis leviter transversali, vertice oculo badio duplo latiore; rostro coxas posticas paullo superante, apice nigro. Long. σ 4 $\frac{1}{2}$ mm.

A *M. Mellae* Reut. corpore superne nigro-piloso, oculis minoribus, tibiis nigro-spinulosis distinguendus. Caput (σ) basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustius, apicem versus levius productum, distincte transversum, a latere visum altitudinem latitudine clypei superans, gula brevi, angulo faciali acuto, vertice oculo duplo latiore. Rostrum articulo primo medium xyphi prosterni vix attingente. Antennae articulo secundo margini basali pronoti longitudine aequali, ultimis fusciscentibus. Pronotum capituli longitudine, basi longitudine duplo latius, lateribus rectis, apice longitudine paullo angustius, margine apicali virescente.