

coloreque antennarum pubescentiaque longa distinguendum.

4. *Lygus suturalis* n. sp.

Oblongus, sat angustus, virescens, superne longius dense tenuiter pallido-pubescentis; antennis nigris, articulo secundo annulo prope basin extremaque basi tertii pallide flavo-testaceis; clavo margine scutellari commissuraque sat late, corio macula anguli interioris membranaque subhyalina vitta percurrente longitudinali apice dilatata nigricantibus; femoribus posticis ante apicem annulis duobus fuscis; tibiis spinulis testaceis e punctis nigro-fuscis nascentibus, tarsis articulo ultimo nigro-fusco; capite fere verticali, vertice margine carinato, disco sulcato, margine postico oculo paullo latiore (♀) vel hoc fere nonnihil angustiore (♂); rostro apicem coxarum posticarum subattingente, articulo primo apicem xyphi prosterni subattingente; antennis articulo primo apicem clypei sat longe superante, secundo primo vix triplo longiore et latitudine basali pronoti circiter $\frac{1}{4}$ longiore, duobus ultimis simul sumtis secundo paullulum longioribus, quarto tertio fere $\frac{1}{5}$ brevioris; pronoto hemielytrisque sat subtiliter dense punctatis, scutello subtiliter subruguloso; pronoto basi longitudine fere dimidio latiore, versus apicem leviter declivi; dorso abdominis nigro. — Long., ♂ 5 $\frac{1}{2}$, ♀ 6 mill.

5. *Charagochilus longicornis* Reut.

Spec. Capsid. Exped. Galat. in Ent. Tidskr., 1884, p. 196.

Varietas antennis articulo primo pallide flavente.

Species hactenus in insulis Nicobaribus inventa.

6. *Camptobrochis scutellaris* n. sp.

Niger vel piceo-niger, nitidus, glaber; scutello pallide sulphureo, macula minuta basali media piceo-nigra; clypeo, loris, linea longitudinali percurrente frontis basi utrinque cum guttula confluyente, rostro, antennis, coxis pedibusque pallido-flaventibus, antennis articulo secundo basi et apice piceo, tertio apice quartoque, basi hujus excepta, picescentibus;