

basi marginato divergens. Corpus oblongum vel oblongo-ovatum, opacum, superne saepe pilis squamiformibus faciliter divellendis vestitum. Caput verticale, antice visum oculis pedunculatis exceptis triangulare, latitudine interoculari vix longius, a latere visum altitudine multo brevius, fronte et clypeo in unum verticalibus, confluentibus, hoc ne minime quidem prominente, basi hujus deplanata et nitente, in medio capitinis linea inter bases antennarum ducta posita, angulo faciali recto, genis altissimis, gula peristomio breviore. Oculi pedunculati, breves, rotundati, orbita interior recta divergentes. Rostrum apicem coxarum intermedianarum attingens, robustum, articulo primo dilatato, secundo primo aequelongo, duobus ultimis simul sumtis secundo paullo longioribus. Antennae paullo infra tertiam basalem partem spatii inter pedunculum oculi et apicem clypei insertae, articulo primo robusto, subcylindrico, rigido-setoso, secundo linearis, latitudini basali pronoti saltem aequelongo, ultimis simul secundo longioribus. Pronotum trapeziforme, lateribus medio sinuatis, disco subhorizontali, callis sat discretis, transversis, basi medio late profundius sinuata. Scutellum basi detectum. Hemielytra cuneo subhorizontali, margine externo versus apicem rotundato, feminae saepe abbreviata. Xyphus prosterni planus, lateribus solum basi marginatus. Metastethium orificiis externe convexis. Coxae anticae medium mesosterni attingentes. Femora postica elongata. Tibiae spinulosae. Tarsi postici articulo primo secundo aequo longo, tertio secundo longiore.

1. *Labops setosus* REUT.

Diagn.: Niger, opacus, pilis squamiformibus totus destitutus, sed superne sat longe fulvo-setosus; capite vittis duabus verticis marginalibus vittaque utrinque generum infra oculos albido-testaceis; limbo laterali corii albido; tibiis annulo infra medium ferrugineo; maris forcipe genitali basi ferrugineo; oculis longe pedunculatis, pedunculo sursum et oblique antrorsum producto; antennis articulo primo margini pronoti apicali aequelongo et articulo secundo fere duplo breviore. Long. ♂ macr. 6, ♀ brach. $4\frac{3}{4}$ —5 mm.

Var. β: Corii limbo laterali cocolore.

Hab. in Sibiria (V. Sujetuk!), D. HAMMARSTROEM.

Descr.: Corpore pilis squamiformibus destituto superne setoso a sequentibus mox distinctus. Corpus nigrum, opacum, solum capite nitidulo. Caput cum oculis basi pronoti aequelatum (♀ brach.) vel paullo angustius (♂), vertice utrinque stria obliqua, vitula laterali infra oculum saepeque macula utrinque juxta basin clypei albido-testaceis; facie utrinque ad basin clypei longe fulvo-sericeo. Oculi longe stylati, slylo sursum et oblique antrorsum vergente, margine inferiore ab antico viso oculo latiore. Rostrum nigrum. Antennae nigrae, articulo primo margini apicali pronoti aequelongo, secundo primo fere duplo longiore, qvarto tertio aequelongo. Pronotum latitudini apicali aequo longum, basi quam apice dimidio (♀ brach.) vel $\frac{3}{5}$ (♂ macr.) latius, disco postico sat fortiter transversim strigosum. Scutellum sub-laeve. Hemielytra (♂) abdomen sat longe