

Voyage de M. E. Simon au Venezuela

(Décembre 1887—Avril 1888)

20^e Mémoire (1)

HÉMIPTÈRES HÉTÉROPTÈRES

1^{re} PARTIE.

CAPSIDES

Par O. M. REUTER.

Séance du 22 juillet 1891.

Divisio **FULVIARIA** Uhler (= *Teratodellaria* Reut.).

1. **FULVIUS ATRATUS** Dist., Biol. Centr.-Amer., Heter., p. 282, tab. xxvii, fig. 18 (forte). — *Nigro-fuscus, sexta parte apicali articuli secundi antennarum, maculis quatuor mesonoti, fascia corii ante medium externe multo latiore, interne medium sutura clavi attingente, arcu basali cunei angusto pedibusque flavo-testaceis; femoribus omnibus dimidio basali, posticis etiam ante apicem fuscis; rostro piceo; antennarum articulo primo capiti æque longo, secundo primo duplo longiore et huic æque crasso, nigro-pubescente.* — Long. fere 5 mill. — Colonia Tovar.

A descriptione Cel. Distantis divergit colore articuli secundi antennarum cuneique. An varietas vel species propria ?

2. **Fulvius Simoni**, n. sp. — *Fusco-niger, antennarum articulo primo toto secundoque magis quam tertia apicali, corii ipsa basi fascia-*


(1) Voir 15^e mémoire (*Coléoptères — Lamellicornes*, par le Dr E. Candèze), Annales 1891, p. 329. On y trouvera la liste des quatorze autres mémoires qui précèdent. — 16^e mémoire (*Arachnides : Chernetes (Pseudoscorpiones)*, par L. Balzan), Annales 1891, p. 497, pl. 9, 10, 11 et 12. — 17^e mémoire (*Hyménoptères*, par Robert du Buysson et T. A. Marshall), Annales 1892, p. 53, pl. 3 et 4. — 18^e mémoire (*Coléoptères Hétéromères*, par L. Fairmaire), Annales 1892, p. 77. — 19^e mémoire (*Coléoptères—Colydiides*, par A. Grouvelle), Annales 1892, p. 98, 5 bois.

Fig. 3. *Mesarmadillo tuberculatus* A. Dollfus, ♂.

- a. Cephalon et 1^{er} segment péréial (vue tergale).
- b. 5^e segment pléonal et pleotelson (vue tergale).
- c. 1^{er} segment péréial (vue sternale).
- d. 1^{er} segment pléonal (vue sternale), avec les pleopodes de la 1^{re} paire.

4. *Synarmadillo clausus* A. Dollfus, ♂.

- a. Cephalon et 1^{er} segment péréial (vue tergale).
- b. 4^e et 5^e segments pléonaux et pleotelson (vue tergale).
- c. 1^{er} segment péréial (vue sternale).
- d. 1^{er} segment pléonal (vue sternale), avec les pleopodes de la 1^{re} paire.
- e. 5^e segment pléonal, pleotelson et uropode (vue sternale).
- f. Extrémité distale de la base d'un uropode (vue sur la face supérieure), avec l'exopodite.
- f. Endopodite de la 1^{re} mâchoire.



Voyage de M. E. Simon au Venezuela

(Décembre 1887—Avril 1888)

20^e Mémoire (1)

HÉMIPTÈRES HÉTÉROPTÈRES

1^{re} PARTIE.

CAPSIDES

Par O. M. REUTER.

Séance du 22 juillet 1891.

Divisio **FULVIARIA** Uhler (= *Teratodellaria* Reut.).

1. **FULVIUS ATRATUS** Dist., Biol. Centr.-Amer., Heter., p. 282, tab. xxvii, fig. 18 (forte). — *Nigro-fuscus, sexta parte apicali articuli secundi antennarum, maculis quatuor mesonoti, fascia corii ante medium externe multo latiore, interne medium suturæ clavi attingente, arcu basali cunei angusto pedibusque flavo-testaceis; femoribus omnibus dimidio basali, posticis etiam ante apicem fuscis; rostro piceo; antennarum articulo primo capiti æque longo, secundo primo duplo longiore et huic æque crasso, nigro-pubescente.* — Long. fere 5 mill. — Colonia Tovar.

A descriptione Cel. Distantis divergit colore articuli secundi antennarum cuneique. An varietas vel species propria?

2. **Fulvius Simoni**, n. sp. — *Fusco-niger, antennarum articulo primo toto secundoque magis quam tertia apicali, corii ipsa basi fascia-*

(1) Voir 15^e mémoire (*Coléoptères — Lamellicornes*, par le Dr E. Candèze), Annales 1891, p. 329. On y trouvera la liste des quatorze autres mémoires qui précèdent. — 16^e mémoire (*Arachnides : Chernetes (Pseudoscorpiones)*, par L. Balzan), Annales 1891, p. 497, pl. 9, 10, 11 et 12. — 17^e mémoire (*Hyménoptères*, par Robert du Buysson et T. A. Marshall), Annales 1892, p. 53, pl. 3 et 4. — 18^e mémoire (*Coléoptères Hétéromères*, par L. Fairmaire), Annales 1892, p. 77. — 19^e mémoire (*Coléoptères — Colydiides*, par A. Grouvelle), Annales 1892, p. 98, 5 bois.

que ante medium sat æquali, dimidio basali cunei, coxis posticis, trochanteribus, extremo apice femorum, tibiis tarsisque flavo-testaceis; antennarum articulo primio capite a latere viso saltem 1/5 breviore, secundo primo duplo longiore et hoc tenuiore, subtilissime pallido-pubescente; rostro picco. — Long. 3 1/2 mill. — Corozal.

Præcedenti minor, antennis aliter coloratis, constructis et pubescen-tibus, cuneo basi latius pallido femoribusque extremo apice excepto fusco-nigris divergens.

Divisio **MIRARIA** Reut.

Dolichomiris Reut.. Ad cogn. Heter. Africæ occid. (in Oefvers. Finska. Vet. Soc. Foerh., XXV), p. 30, 59.

Corpus valde elongatum, parallelum, glabriuscum; capite porrecto, horizontali, latitudine multo longiore, a latere viso fere parallelogram-mico et altitudine duplo longiore, vertice sulco distincto, fronte apice acutangulariter prominulo ultra basin clypei breviter producto, clypeo fortiter prominente, margine apicali retrorsum vergente; rostro articulo primo longitudine capitidis; antennis corpore longioribus, articulo primo pronoto capitique usque ad basin clypei longitudine æquali vel sub-æquali, primo toto basique secundi dense pilosis, hoc basin versus in-crassato; pronoto scutelloque impunctatis, illo latitudine basali longiore. lateribus acutis, antice marginatis, basi profunde sinuata; scutello pronoti longitudine, basi detecta utrinque carina transversa vel obliqua; femoribus linearibus, tibiis anterioribus interne spinulosis, posticis spinulis destitutis, dense longe et molliter pilosis. A Nostotira Fieb. fronte apice integra solum basin clypei tegente divergens.

3. **D. tibialis**, n. sp. — *Pallide flavens, nitidulus, atomis plerumque seriatis articuli primi antennarum, linea marginis apicalis clypei, linea media longitudinali capitidis lineisque duabus longitudinalibus mediis valde appropinquatis pronoti et scutelli, vitta utrinque laterali per caput et pronotum ducta ab oculis interrupta, vitta per latera capitidis, pectoris et ventris ducta tibiisque posticis cum tarsis coccineis vel ad partem fusco-coccineis, tarsis articulo tertio apice fusco; scutello parte basali sulphurescenti, utrinque carina leviter arcuata obliqua; antennis articulo primo dense semiadpressim longe flavo-piloso, articulo secundo primo circiter 3/4 longiore, 2/5 basalibus dense pilosis. pilis versus apicem sensim brevioribus, tertio secundo adhuc longiore; membrana leviter sumata, iridescente, venis pallidis. — ♀. Long. 9 2/3 mill. — Colonia Tovar.*

4. **COLLARIA OLEOSA** Dist., Biol. Centr.-Amer., Het., p. 238, tab. XXIV, fig. 2. — Colonia Tovar, San-Esteban, Caracas.

Divisio **BRYOCORARIA** Reut. (= *Bryocoraria* Reut. et *Eccritotarsaria* Reut. et Berg.).

Capite nutante vel verticali, vertice raro sulco vel fovea longitudinali instructo; rostro plerumque admodum crasso et brevi, raro coxas posticas attingente; pronoto strictura apicali annuliformi distincto, lateribus obtusis; hemelytris cuneo discreto, saepe (non tamen semper) vena corii cubitali a basi ultra medium impressa, dein abrupta, interdum tota deleta, membrana areola unica triangulari vel rarius ovali; alis areola hamo destituta; xypho prosterni marginato; coxis posticis ab epipleuris hemelytrorum sat remotis; tarsis versus apicem ampliatis et incrassatis, aroliis magnis a basi maxime divaricatis, ad unguiculos approximatis iisque parum brevioribus.

5. **ECCRITOTARSUS SPLENDENS** Dist., Biol. Centr.-Amer., Het., p. 284, 4, tab. XXVIII, fig. 1. — Varietas margine laterali corii pallide ochraceo, pronoto macula media basali nigricante. — Caracas.

Cyrtocapsus Reut., Caps. ex Amer. bor. (in Oefvers. Svenska Vet. Akad. Foerh., 1875, n° 9), p. 78. Synon. : *Perithous* Dist., Biol. Centr.-Amer., Het., p. 302.

Corpus convexum; capite valde nutante vel subverticali, basi pronoti fere duplo angustiore, basi cum oculis longitudini xque lato, infra oculos rostrato-producto, gula sat longa, obliqua, bucculis sat elevatis, brevibus, vertice immarginato, clypeo sat arcuato, a latere viso ubique fere xque lato, compresso, basi in linea inter apices oculorum ducta posita, a fronte impressione vel incisura discreta, angulo faciali acuto; oculis oblongo-ovatis, sat magnis, orbita interiore parallelis vel vix sinuatis; rostro apicem mesosterni subattingente vel ejus medium vix superante, crassiusculo, articulo primo basin capitinis haud attingente, secundo primo vix longiore; antennis mox supra tertium partem inferiorem marginis interioris oculorum insertis, articulo primo sat longo, tenui, clypeum vix superante, secundo latitudine capitinis breviore, versus apicem sensim leviter incrassato, tertio secundo breviore, quarto gracili, longissimo; pronoto sat dense impresso-punctato, callis sat magnis fere quadrangularibus, disco pone callos alte convexo, versus marginem basalem iterum declivi, margine basali late rotundato, medio subtruncato, longitudine vix vel paulo latiore, lateribus subsinuatis versus apicem

fortiter angustato, strictura apicali distincta; hemielytris levibus, opacis, maculatim griseo-pubescentibus, embolio late incrassato, corii vena unica usque ad medium impressa dein abrupta, fractura laterali cunei profunde excisa, cuneo declivi, latitudini aequa longo; coxis posticis ab epipleuris hemielytrorum remotis; pedibus breviusculis, femoribus posticis usque ad medium marginis superioris sat tumido-convexis, dein usque in apicem parallelis, tibiis muticis.

6. **C. femoralis**, n. sp. — *Niger, opacus, capite, pronoto scutelloque pube longa densa cinerea tectis, capite utrinque lineolis transversalibus denudatis, maculis lateralibus pectoris et ventris pube subargentea longa vestitis; antennis articulo primo, macula apicali articuli secundi rostri, coxis, femoribus basi, tibiis circiter 3/5 apicalibus tarsisque albidis, his apice leviter infuscatis; antennis pallide luteis, articulo tertio versus apicem quartoque infuscatis, articulo secundo latitudine verticis oculique unici vix longiore, tertio secundo circiter 1/4 breviore et primo aequa longo, quarto duobus precedentibus simul sumptis parum breviore; hemielytris nigrofuscis, maculis cinereo-pubescentibus notatis, embolio anguloque interiore corii latius fuscescenti-testaceis; membrana albida, vena brachiali et parte interiore areole infuscatis.* — Long. 2 1/2 mill. — San-Esteban.

C. CALIGINEO Stål (= *Perithoo pallidipedi* Dist., loc. cit., p. 302, I, tab. XXIX, fig. 11) *similis, colore rostri, femoribus basi excepta tibiarumque 2/3 basalibus nigris nec non pubescentia longiore et densiore mox distinguendus.*

Physetonotus, nov. gen.

Corpus ovale, capite, pronoto scutelloque nitidis, impresso-punctatis; capite subverticali, basi pronoti magis quam duplo angustiore, basi cum oculis longitudini fere aequa lato, infra oculos rostrato-produco, a latere viso brevi et alto, gula vix distinguenda, vertice immarginato, fronte perpendiculari, clypeo sat prominente, sat compresso, a latere viso ubique fere aequa lato, leviter arcuato, nonnihil retrorsum vergente, basi a fronte incisura discreta, infra lineam inter apices oculorum ductam posita, angulo faciali recto, genis altis; oculis ovatis medium laterum capitilis haud superantibus, orbita interiore subparallelis; rostro articulo primo medium xyphi prosterni attingente; antennis ad apicem oculorum vel mox supra hunc insertis, articulo primo apicem clypei haud superante, secundo latitudine capitilis haud vel paullulum longiore, versus apicem sensim leviter incrassato, ultimis gracilibus, simul secundo saltum

duplo longioribus, tertio quarto vix vel paullo breviore; pronoto longitudine vix latiore, dense et fortiter impresso-punctato, angulo apicali magis minusve discreto, callis parvulis, nitentibus, apici appropinquatis, disco mox pone callos altissime tumido vel fere inflato-convexo, iterum ad marginem basalem declivi, parte inflata structura variabili, lateribus versus apicem fortiter angustatis, basi quam apice circiter triplo latiore; hemielytris levibus opacis, locis sericeo-micantibus variegatis, embolio bene discreto, fractura cunei haud excisa, cuneo declivi, latitudini basali æque longo; coxis posticis ab epipleuris hemielytrorum remolis; pedibus breviusculis; femoribus posticis margine superiore usque ad medium sat convexis, dein in apicem usque subparallelis, tibiis muticis.

A genere præcedente capite verticali a latere viso breviore, angulo ejus faciali recto, antennis inferius positis, articulo earum tertio primo saltem duplo longiore, pronoti callis minutis discoque ejus postico adhuc multo altius convexo, fortius impresso-punctato, fractura cunei haud profunde excisa, etc., mox distinctus.

Hoc genus in subgenera duo sequentia divido :

1. Physetonotus mihi : *fronte media foveola impressa; pronoto postice supra scutellum inflato-producto, æqualiter convexo, margine basali late rotundato; scutello vix visibili.*

2. Orinonotus mihi : *fronte medio vix impressa sed levigata; pronoto disco postico utrinque ad latera medioque longitrorsum impresso, versus marginem basalem perpendiculariter declivi, margine hoc truncato; scutello solum basi detecto.*

7. **PHYSETONOTUS (PHYSETONOTUS) ATRATUS** Dist., Biol. Centr.-Amer., Het., p. 285, 10, tab. XXVI, fig. 20 (*Eccritotarsus*). — Caracas.

8. Physetonotus (Orinonotus) Simoni, n. sp. — *Niger, nitidus, parcus tenuissime griseo-pubescentis, pronoto postice impressionibus minus profundis, gibbis inter eas parum altis obtusissime rotundatis; capite marginibus orbitalibus interioribus apiceque utrinque juxta clypeum testaceis; antennis, rostro, pedibus totis orificiisque metastethii albidis; hemielytris brevissime subseriatim flavicanti-puberulis, corio locis sericeo-cineruscentibus, embolio macula majore ante medium aliaque minore quadrangulari ante apicem nec non cuneo membranaque albidis, margine basali cunei anguste nigro; antennis articulo secundo latitudini capitum cum oculis longitudine subæquali, tertio secundo paullo longiore et quarto æque longo. — Long. 2 3/4 mill. — Caracas.*

A Phys. (Orin.) incurvo Dist. (Biol. Centr.-Amer., Het., p. 285, 8, tab. xxvi, fig. 19, Ecclitotarsus), cuius specimina e Mexico examinavi, differt corpore minore, multo parcius et tenuissime cinereo-pubescente, magis nitido, capite latius nigro, venis membranæ pallidis (nec fuscis), femoribus omnibus totis albidis (nec posticis ante apicem infuscatis vel nigro-annulatis), præcipue pronoto nigro (nec ænescente), non nisi tenuissime (nec dense et longe) cinereo-pubescente, disco ejus postico impressionibus longitudinalibus multo obtusioribus (nec profundis et gibbas duas magnas et altas inter se formantibus).

Pristoneura, nov. gen.

Corpus parvum, alter convexum; capite parvo, lxxi, pronoto fere triplo angustiore, subverticali, ab antico viso latitudine cum oculis distincte breviore, vertice immarginato, fronte medio levissime impressa, clypeo prominente, subcarinato-compresso, sat fortiter arcuato, basi a fronte discreto, ipsa basi mox supra lineam inter scrobes antennarum ductam posita; capite a latere viso brevi, gula vix distinguenda, genis humilibus, angulo faciali recto; oculis oblongis, in genas longe extensis, orbita intiore parallelis; rostro crassiusculo, coxis intermedias attingente; antennæ fere ad tertiam inferiorem partem marginis interioris oculorum insertis, articulo primo clypeum vix superante, secundo latitudine capitinis haud longiore, versus apicem sensim leviter incrassato, ultimis longis; pronoto distincte transverso, impresso-punctato, annulo collari distincto, callis ad apicem appropinquatis, valde transversis, parvis, obliquis, disco pone eos versus basin sensim alte convexo, margine basali truncato, lateribus rectis versus apicem fortiter incrassatis, apice quam basi triplo angustiore; scutello sat magno, impresso-punctato, basi depressa detecta; hemelytris cuneo brevi perpendiculariter declivi, fractura profunda, vena clavi suturæ appropinquata recta, vena corii juxta suturam clavi non nihil arcuata margineque interiore embolii omnibus transversim dense et fortiter carinulatis, vena cubitali corii nulla, hemelytris cetero levibus, parce pubescentibus, embolio versus apicem dilatato; membrana areola magna, unica, vena ejus brachiali versus basin arcuata; metastethio orificiis parvis rotundatis; pedibus breviusculis, coxis posticis ab epipleuris hemelytrorum longe remotis, femoribus gracibus, tibiis muticis.

9. **P. picea**, n. sp. -- *Obscure picea, subtiliter parcius pallido-pubescent, inferne piceo-nigra, nitida; capite, dimidio basali articuli*

secundi antennarum, orificiis metastethii pedibusque testaceis; antennis articulo secundo primo duplo longiore, tertio secundo fere dimidio longiore; pronoto et scutello dense sat fortiter impresso-punctatis. — Long. 1 3/4 mil. — Colonia Tovar.

Divisio **PERISSOBASARIA** mihi.

Capite subporrecto, fronte subhorizontali, vertice linea longitudinali impressa, loris haud discretis; rostro gracili; pronoto strictura apicali annuliformi distinctissima, lateribus obtusis; hemelytris cunco discreto, corio venis brachiali et cubitali (sat ægre) distinguendis; membrana biareolata; alis areola hamo destituta: pedibus gracilibus, tarsis brevibus, crassiusculis, inferne dense pilosis, articulo primo longo, secundo brevissimo, in medio plagæ superioris primi immerso, inferne primo saltem triplo breviore, tertio primo parum breviore, versus apicem distincte incrassato; unguiculis fere a medio subito angulato-curvatis, aroliis angustis cum iis connexis fere medium unguiculorum attingentibus.

Divisioni Bryocoraria Reut. proxima, differt aroliis angustis cum unguiculis totis connexis, corio vena cubitali usque in apicem distinctuenda, haud impressa, membrana areolis duabus instructa. A divisione Capsaria Reut. aroliis cum unguiculis connexis, a divisione Dicypharia Reut. loris capitinis haud discretis et tarsis articulo secundo primo et tertio multo breviore, ab ambobus articulo tarisorum brevium ultimo versus apicem distincte incrassato-ampliato distinguenda.

Perissobasis, nov. gen.

Corpus oblongum, superne pilosum; capite fere porrecto, levissime nutante, ab antico viso latitudine rix longiore, vertice fortiter carinato-marginato, fronte subhorizontali, basi linea media longitudinali impressa, apice subito perpendiculari; capite a latere viso altitudine paullo longiore, clypeo perpendiculari, basi in linea inter scrobes antennarum ducta posita, angulo faciali recto, loris haud discretis, genis humilibus, bucculis sat elevatis, gula dimidium capitinis occupante, horizontali, leviter convexa; oculis haud prominentibus, in genas longe extensis, orbita inferiore infra medium fortiter sinuatim; rostro gracili, apicem mesosterni attingente, articulo primo basin capitinis attingente; antennis pilosis, in sinu oculorum inferne insertis, articulo primo maximo, pronoto annulo collari excepto æque longo, valde dilatato-explanato. reliquis gracilibus,

linearibus, secundo ultimis simul sumptis multo longiore; pronoto capite multo longiore, apice capite angustiore annulo lato collari instructo, basi quam apice triplo et latitudine paullo latiore, lateribus usque ad annulum apicalem subrectis, callis transversim ad unum confluentibus, pone eum sulco transversali latera tuner haud superante instructo, disco postico versus medium sensim declivi, remote impresso-punctato, margine basali levissime rotundato; scutello basi anguste detecto; hemelytris parallelis, embolio lato nonnihil reflexo, corio venis brachiali et cubitali (sat ægre) distinguendis, cuneo subhorizontali, elegato-triangulari, membrana biareolata; pedibus gracilibus, longe pilosis, femoribus elongatis, linearibus, tibiis spinis rigidis destitutis; terebra feminæ longa.

10. **P. aurora**, n. sp. — *Inferne punicea vel sanguinea, superne capite lutescente, pronoto scutelloque pallide flavescentibus, illo limbis lateralibus late fuscis, hemelytris pallide flaventibus, colore in puniceum vergentibus, embolio apice excepto pallido, clavo limbo exteriore excepto corioque basi et macula interiori apicali fuscis, membrana subhyalina, venis obscure puniceis, areola majore leviter infuscata, ejus parte juxta venam cubitalem areolaque minore albida; rostro, antennis pedibusque flavicanti-albidis, illarum articulo primo crocco, secundo primo duplo longiore, apice tenuiter crocco, tertio primo breviore, quarto iterum tertio breviore; capite, scutello hemelytrisque laxibus, pronoto remote impresso-punctato; vertice oculo fere 1/3 latiore. — ♀. Long. 5 2/5 mill.*

— San-Esteban.

Divisio **MONALONIONARIA** mihi (= *Valdasaria* Dist.).

11. **MONALONION ANNULIPES** Sign., Ann. Soc. ent. Fr., 3^e sér., VI, p. 50. — Dist., Biol. Centr.-Amer., Het., p. 246, tab. XXIII, fig. 25. — Caracas.

Varietas nigra, basi corii pallida basique abdominis rubro, aliaque thorace toto rubro.

Divisio **CAPSARIA** Reut.

12. **Phytocoris Bergrothi**, n. sp. — *Grisescens, superne pilis subadpressis vel semi-adpressis (pronoti magis exsertis) pallidis dense pilosus, capite pronotoque antice albidis; clypeo lorisque sanguineo-conspersis; fronte utrinque lineis transversalibus vittaque media, vertice marginæ postico, pronoto maculis duabus apicalibus aliisque duabus mox*

pone callos nec non scutello macula media basali aurantiacis; pronoto postice lateribusque usque ad apicem griseacente, ante marginem posticum maculis quatuor anguste confluentibus nigris, ipso margine albido; scutello apicem versus leviter virescenti-pallido; hemelytris vena clavi, corio juxta suturam clavi margineque exteriore nigro-conspersis, cuneo dense minutissime nigricanti-consperso, apice late punctoque in tertia basali parte suturæ membranae nigris, extremo apice pallido; corio nitidulo, angulo interiore macula opaca sordide virescente postice infuscata; membrana pallida, griseo-irrorata, venis omnibus pallidis; antennis albidis, articulo primo tenui, pronoti longitudine, sanguineo-fusco-consperso, secundo toto pallido, longissimo, primo duplo et dimidio longiore, ultimis nigris, tertio basi albo; rostro medium ventris sat longe superante, albido, apice nigro; pedibus albicantibus, femoribus apice nigro-conspersis, tibiis saltē anticis (postici desunt) breviter pallido-spinulosis, margine antico usque ad partem quartam apicalem nigris; orificiis metastethii virescentibus; capite fortiter nutante, clypeo a fronte leviter discreto, angulo fasciali acuto, vertice feminæ oculo vix latiore. — ♀.
Long. 5 3/4 mill. — Caracas.

Signatura tibiarum P. tibiali Reut. ex America boreali affinis, mox tamen notis supra datis distinguendus.

13. Phytocoris tripunctatus, n. sp. — *Pallide sordide flavens, sat nitidus, superne pallido-pubescentes; capite linea longitudinali media usque ad basin clypei ducta colloque guttis duabus aurantiacis; capite lateribus vittis duabus ante-ocularibus, pronoto macula utrinque ad annulum apicalem maculaque paullo majore rotundata media mox pone callos, epimeris prothoracis vittis duabus longitudinalibus, metastethio lateribus nigris vel nigro-rufis; scutello angulis basalibus vittisque duabus mediis nigro-fuscis vel fuscis; clavo corioque interne magis minusve fusco-conspurcatis, cuneo apice concolori vel fuscescente; membrana sordide fuscescenti-conspurcata, venis sordidis vel rufescensibus; antennis fuscis paullo magis robustis (♂) vel pallidis, gracilioribus, articulo secundo apice nigro (ulti desint), articulo primo setis rigidis destituto, pronoto et dimidio oculi a supero visis æque longo (♂) vel pronoto parum longiore (♀), secundo primo circiter duplo et dimidio longiore; rostro pallido, medium ventris sat superante, apice nigro; pedibus pallide flaventibus, femoribus posticis versus apicem sordide fuscescenti-nebulosatis, tibiis omnibus innotatis, testaceo-spinulosis, tarsis apice leviter infuscatis; pronoto subruguloso-punctulato; capite verticali, fronte apice sat convexa, clypeo ante apicem distincte depresso, angulo*

faciali levissime acutiusculo, vertice oculo haud vel paullulum latiore. — Long. 6 1/2 mill. — Colonia Tovar.

Species pubescentia minus intricata, signatura insigni pronoti, antennis sexuum discoloribus, pronoto subruguloso-punctulato distinctissima.

Chrysodasia, nov. gen.

Corpus oblongo-ovale, superne sat fortiter aureo-pubescent; capite cum oculis magnis exsertis apice pronoti sat multo latiore, nutante, ab antico viso subtransverso, aureo-pubescente, vertice margine postico arcuato, utrinque ad oculum macula glabra et levigata notato, fronte utrinque strigis obliquis denudatis sculpturata, clypeo sat fortiter arcuato, basi a fronte leviter discreto, ipsi basi in linea inter scrobes antennarum ducta posita, gula obliqua dimidium capitinis attingente, genis valde humilibus, angulo faciali acuto; oculis magnis, granulatis ad maximam partem ultra annulum pronoti apicalem exsertis, orbita interiore fortiter emarginatis; rostro apicem mesosterni paullo superante, versus apicem sensim acuminato, articulo primo medium xyphi prosterni attingente; antennis in sinu oculorum insertis, articulo primo apicem clypei paullo superante, secundo versus apicem sensim incrassato, latitudine capitinis multo longiore, ultimis simul secundo brevioribus; pronoto trapeziformi transverso, basi quam apice triplo latiore, lateribus rectis, disco versus apicem sat fortiter convexo-declivi, ubique etiam annulo apicali aureo-pubescente. solum callis glabris, leviter obliquis, rectangularibus, medio sat distantibus; scutello impresso-punctato, sat convexo, apice depresso; hemielytris obsoletius punctulatis, minus dense aureo-pubescentibus, corio furca cubiti distincta, cuneo concolore, sat fortiter declivi, incisura parum profunda; orificiis metastethii distinctissimis; pedibus breviusculis, femoribus posticis elongatis, tibiis pilis rigidis decumbentibus pilosis, sed spinulis destitutis, posticis leviter curvatis, tarsis articulo primo secundo paullo breviore, unguiculis sat fortiter arcuatis, basi in denticulum ampliatis.

A Lygo Hahn, Reut. oculis majoribus et magis exsertis, capite et anulo apicali pronoti pubescentibus, fronte strigosa, tibiis omnibus spinulis destitutis pubeque aurea divellenda divergens; Ab Agnocori Reut., cui primo intuitu sat similis, structura capitinis, antennarum et pronoti tibiisque totis muticis distincta; a Poeciloscyto Fieb. fronte strigosa, pronoto scutello fortiter impresso - punctatus, orificiis metastethii distinctioribus, pedibus brevioribus, tibiis muticis, posticis leviter arcuatibus mox distinguenda.

14. **C. strigifrons**, n. sp. — *Testacea vel flavo-ferruginea, superne fortius sat longe aureo-pubescent, pronoti lateribus magis exserte pilosis; antennis articulo secundo versus apicem ultimisque nigris, tertio basi et apice angustissime albido, secundo latitudine basali pronoti paullo breviore, tertio secundo duplo breviore, quarto tertio fere 1/3 breviore; pronoto basi longitudine vix duplo latiore.* — Long. 5 1/2 mill. — Colonia Tovar.

Divisio **DICYPHARIA** Reut.

15. **ANNONA BIMACULATA** Dist., Biol. Centr.-Amer., p. 290, tab. xxvii, fig. 25 (*Ania*), p. 297.

Varietas pronoto maculis disci postici destituto. — Caracas.

Genus divisionis Dicypharia nec Phytocoraria !. Oculis pronoto contiguis, articulo primo antennarum longo, tenui, sutura clavi suturaque embolii explanati interiore transversim dense carinulatis articuloque secundo tarsorum posticorum tertio parum longiore insigne.

Divisio **CYLLOCORARIA** Reut.

Schizonotus, nov. gen.

Corpus angustum, laxe, nitidum, medio constrictum; capite magno, fere semigloboso, fortiter nutante, ab antico viso basi pronoti paullulum angustiore, late breviterque ovato, vertice supra oculos elevato, margine arcuato retrorsum supra annulum apicalem pronoti producto, fronte convexa cum vertice et clypeo in arcum communem confluente, clypeo sat lato, toto depresso, basi in linea inter scrobes antennarum ducta posita; capite a latere viso altitudine multo breviore, loris discretis angustis versus scrobes antennarum vergentibus, angulo faciali acutiusculo, bucculis linearibus, genis sat humilibus, gula obliqua dimidium capitidis occupante; oculis ne minime quidem prominulis, sublxxvibus, in genas sat longe extensis, orbita interiore infra medium subsinuatis versus apicem vix divergentibus, orbita posteriore late sinuatis; rostro medium mesosterni attingente, gracili, articulo primo bucculas haud superante, secundo et tertio æque longis, quarto tertio longiore; antennis paullo supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo brevi, apicem clypei haud attingente, secundo latitudini verticis longitudine æquali, versus apicem leviter incrassato, duobus ultimis crassis, quarto fusiformi; pronoto latitudine postica parum breviore, ante medium valde constricto et sulco transversali profundo latera superante instructo, parte

antica a medio versus apicem dilatata lateribus rectis, apice tuberculis tribus conicis, medio lateralique utrinque, instructa, tuberculo medio antrorsum, lateralibus antrorsum et extrorsum vergentibus; parte pronoti postica versus basin fortiter dilatata, lateribus rectis, inter angulos basales strictura media magis quam triplo latiore, disco a strictura versus basin in gibbam altissimam transversim compressam margine supero late arcuatam surgente, hac gibba medio subimpressa, postice perpendiculariter vel fere antrorsum nutante; scutello parvulo; hemielytris paullo ante medium corii parallelis, embolio dein subito usque ad apicem fortiter dilatato-rotundato, cuneo brevi, embolio fere toto cuneoque externe versus latera deflexis, membrana biareolata; rima orificio-rum metastethii subtili, transversa; abdomine dilatato, terebra feminax longa; tibiis anticis submuticis (pedes postici desunt).

Genus structura antennarum, pronoti et hemielytrorum valde insigne; structura capitis et rostri articuloque primo antennarum brevi Globicepi sphegiformi Rossi affinis.

16. **S. dromedarius**, n. sp. — *Superne fulvus vel ferrugineus, inferne cum femoribus in sordide coccineum vergens, parce tenuissime pallido-pubescent, antennarum articulo primo apiceque secundi nec non coxis posterioribus albidis; antennis articulo primo basi et vitta superiore secundoque, apice excepto, fuscis, ultimis nigris, tertio secundo fere 1/4 breviore, quarto tertio aequo longo; tibiis tarsisque fuscis, his diuidio basali albidis; hemielytris fulvis vel cinnamomeis, basi clavi fascia que ante medium corii dense niveo-squamosis, corio pone hunc fasciam, cuneo membranaque nigro-piceis, embolio fulvo, apice rufo-piceo.* — ♀. Long. 2 1/2 mill. — Caracas.

