

margini inferiore punctis nonnullis instructis, tarsorum articulis duobus ultimis aequae longis; a *Campylomma* Reut. corpore opaculo, capite multo latiore, opaco, pronoto apicem versus minus angustato, femoribus punctis magnis nigris destitutis, aroliis unguiculorum haud distinguendis divergens, hac nota characteristicam etiam a reliquis affinibus mox distincta. Caput infra oculos breviter productum, angulo faciali recto, margine postico verticis aequali, clypeo basi longius supra lineam inter bases antennarum ductam, fere in linea intermedia oculorum posita. Antennae articulo primo apicem clypei paullo superante, secundo sub-lineari. Pronotum basi longitudine magis quam duplo latius, lateribus rectis margine apicali circiter duplo brevioribus, basi truncata, disco apicem versus leviter declivi. Scutellum basi late detectum.

Aphaenophyes laticeps Reut.

Diagn.: Pallide flavicanti-albida, opaca, tenuissime albedo-pubescens, hemielytris leviter nitidulis, omnium dilutissime in virescentem vergentibus; fronte, callis pronoti basique scutelli dilute sub-ochraceis, oculis nigris; femoribus posticis margine inferiore punctis tribus fuscis notatis; tibiis spinulis sat longis et robustis nigris e punctis sat magnis nigris nascentibus, tarsis articulo ultimo extremo apice fusco. Long. ♀ 2 1/2 mm.

Hab. in Algeria (Chott Meirhir!, unicum specimen), D. Handlirsch (Mus. Vind.); Biskra!, D. de Vauloger (coll. Montandon).

Descr.: Notis supra datis optime distinguenda.

5. **Sthenarus fuscicornis** Reut.

Diagn.: Ovalis, nigro-piceus; sat nitidus; capite pronoto circiter 1/3 angustiore; rostro pedibusque sordide flaventibus, femoribus solum posticis margine superiore punctis 2—3 nigris, tibiis spinulis sat longis nigris e punctis fuscis sat obsoletis nascentibus, tarsis articulo ultimo fusco;