

distinguendus, a *Sth. oculari* M. et R. adhuc antennis brevioribus, a *Sth. nigripilis* Reut. colore articuli secundi antennarum staturaque angustiore, a *Sth. maculipedi* Reut. tibiis multo subtilius et remotius punctatis distinctus. Caput vertice haud marginato, sed margine tenui, oculo duplo (♂) vel paullo magis quam duplo latiore. Rostrum articulo primo caput vix superante. Antennae articulo secundo maris quam feminae] paullo crassiore. Pronotum basi longitudine fere duplo latiore, apice longitudini aequae lato, lateribus pilis nonnullis exsertis nigris, disco sat convexo. Membrana cum areolis et venis nigricans, areolis exceptis vivaciter iridescens. Tibiae spinulis brevibus armatae.

7. Orthopidea Reut.

Diagn.: Corpus oblongum (♂) vel oblongo-ovatum (♀), nitidum; capite basi pronoti multo angustiore, fortius (♂) vel leviter (♀) transverso, fortiter nutante, vertice omnium tenuissime marginato, clypeo compresso, basi cum fronte confluyente, ipsa basi sat longe supra lineam inter scrobes antennarum ductam posita, genis humilibus, gula bene distincta, obliqua; oculis laevibus; rostro apicem coxarum posticarum subattingente, articulo primo caput vix superante; antennis paullo supra apicem oculorum interne insertis, articulo secundo utriusque sexus gracili; pronoto trapeziformi, apice ab antico viso medio sinuato; alarum areola hamo a vena sustensa emisso; femoribus tibiisque posterioribus punctatis, tibiis basi concoloribus; tarsis brevibus, unguiculis minusculis, apice fortius curvatis, aroliis ad curvaturam extensis; tarsis posticis articulo tertio duobus primis simul sumtis parum brevioribus.

Habitat in parte mediterranea regionis.

Descr.: A genere *Plagiognathus* Fieb., Reut., cui maxime affinis, vertice tenuiter marginato, clypeo basi a fronte haud discreto, rostro articulo primo brevioribus, tibiis basi concoloribus, tarsis brevioribus, articulo tertio secundo longiore, unguiculisque minoribus fortius curvatis distincta;