

articuli secundi antennarum divergens, ab *A. parvulo* Reut. structura antennarum incisuraque fracturae cunei parum profunda distinctus, ab *A. forticorni* M. et R. corpore minore, articulo secundo antennarum (♀) versus basin longius attenuato coloreque venarum membranae discedens. Caput basi pronoti fere $\frac{1}{3}$ angustius, vertice (♀) oculo paullo magis quam dimidio latiore. Oculi fusco-rufi. Antennae (♀) articulo secundo margine basali pronoti saltem $\frac{1}{3}$ brevior, latitudine capitis parum (in *A. magnicorni* distinctissime) longiore, adpressim nigro-piloso, cum pilis articulo primo vix duplo crassiore, crassitie maxima circiter triplo longiore, basin versus sensim longius gracilimente, articulo tertio secundo duplo brevior. Pronotum valde transversum.

10. *Atractotomus Schmiedeknechti* Reut.

Diagn.: Ovalis, niger, inferne squamis albis tectus (squamae dorsi detritae); antennis articulis duobus primis nigris, feminae (mas ignotus) articulo secundo sat tenuiter fusiformi, margini basali pronoti fere aequae longo, apice longius attenuato, ultimis pallide flavis, simul sumtis secundo aequae longis; hemielytris fuscis. unicoloribus, incisura cunei parum profunda, membrana nigricante, venis obscure fuscis, connectente flavo-testacea, macula ad apicem cunei hyalina; pedibus sordide piceo-testaceis, femoribus saltem posticis, apice excepto, nigricantibus, tibiis spinulis nigris e punctis obsoletis, nigricantibus enascentibus. Long. ♀ $2\frac{1}{2}$ mm.

Hab. Algeria (Oran, Tlemeen!), D. Dr Schmiedeknecht, comm. D. Dr Fokker.

Descr.: Primo intuitu *A. magnicorni* Fall. sat similis, mox autem colore venarum membranae structuraque antennarum distinguendus, ab *A. parvulo* Reut. structura antennarum longe diversa fracturaque cunei parum profunda divergens. Caput basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustius, vertice concolore, oculo circiter $\frac{3}{4}$ latiore (♀). Antennae articulo secundo primo circiter quadruplo longiore, mar-