

anguli exterioris basalis, area venam brachialem terminante areolaque majore hyalinis, hac apicem versus nigricante; antennis, rostro pedibusque flavicanti-albidis, illis articulo primo, ipso apice excepto, nigro; femoribus fusco-punctatis, tibiis spinulis fuscis e punctis sat minutis fuscis nascentibus; vertice maris oculo paullo magis quam duplo latiore; antennis articulo secundo margini basali pronoti aequae longo. Long. ♂ $5 \frac{4}{5}$ mm.

Hab. in Algeria (Biskra!), D. Dr Puton.

Descr.: Ab omnibus hujus generis colore hemielytrorum mox distinctus. Caput (♂) transversum, fusco-griseum, margine verticis nonnihil dilutiore, gula parum distincta. Pronotum (♂) basi longitudine magis quam duplo latiore, apice longitudine distincte latiore. Scutellum angulis partis detectae basalibus paullo dilutioribus. Hemielytra maris abdomen longe superantia. Pectus nigro-fuscum, orificiis concoloribus. Abdomen maris grisescens. Tibiae basi concolores.

13. *Psallus pulchellus* Reut.

Diagn.: Obscure cinerascens-fuscus, superne nitidus, pilis albidis faciliter divellendis vestitus, parcius nigro-pilosus; antennis articulo primo nigro, secundo lurido-testaceo, ejus apice ultimisque fuscis, femoribus totis sordide flavescens, ubique densius nigro-punctatis, tibiis tarsisque albidis, illis spinulis nigris sat brevibus e punctis sat magnis nigris nascentibus, his articulo ultimo nigro; apice scutelli anguste albido, margine apicali corii basique cunei albidis, apice cunei anguste albido; membrana cum areolis nigricante, venis cubitali et connectente nec non macula ad apicem cunei albidis, maris vertice oculo $\frac{1}{4}$ latiore, articulo secundo antennarum margini basali pronoti aequae lato. Long. ♂ $3 \frac{2}{5}$ mm.

Hab. in Algeria (Oran, Oued-Risu!), D. Vauloger.

Descr.: *Ps. siculo* Reut. similis, sed major, femoribus basin versus haud infuscatis articuloque antennarum se-