

areolae minoris attingente, puncto infra ejus apicem marginique interiore basin versus nigro-fuscis. Vertex limbo fuscescente (σ^x). Femora posteriora inferne serie atomorum nigrorum signata.

21. *Macrotylus Montandoni* Reut.

Diagn.: Sordide dilute virescens, superne densius aequaliter nigro-pilosus, hemielytris venis basi que cunei nec glabris nec pallidioribus; corio apice nebula majuscula fusco-grisescens; membrana infuscata, venis albidis, macula discoidali, areola majore, apice limboque ad venam brachialem exceptis, macula anguli basalis exterioris triangulari aliaque in medio limbi exterioris sita rectangulari albidis, spatium inter has maculas obscurius infuscata, vitta vel puncto nigro infra apicem venae cubitalis deficiente; capite latitudini basali aequo lato (φ); antennis pedibusque colore corporis, illis versus apicem obscurioribus, articulo secundo latitudine capitis multo longiore, tarsis articulo ultimo fusco; pronoto lateribus rectis; xypho prosterni marginato. Long. φ 4 $\frac{1}{4}$ mm.

Hab. in Romania (Plaineschi!), D. A. L. Montandon.

Descr.: *M. solitario* Mey. multo minor, differt hemielytrorum venis basi que cunei nec glabris nec pallidioribus, membrana puncto infra apicem venae cubitalis nigro destituta nec non capite brevior. Caput pronoto longitudine subaequale, a latere visum altitudine vix brevius, gula brevi, vertice (φ) oculo saltem duplo et dimidio latiore. Rostrum apicem coxarum posticarum attingens, apice nigro. Pronotum basi longitudine duplo latiore, apice longitudine aequo lato. Pectus et venter in specimine pubescentia detrita. Pedes nigro-pubescentes. Femora punctis destituta. Tibiae spinulis nigris brevibus.

22. *Amblytylus vittiger* Reut.

Diagn.: Albicans, capite, callis pronoti basi que scutelli dilute stramineis, vitta media albida percurrente; su-