

tice oculo circiter dimidio latiore; rostro medium ventris subattingente, apice nigro. Long. ♂ $5\frac{3}{4}$ mm.

Hab. in Algeria (Ain Sefra!), D. Bleuse, commun. D. Dr Puton; Oran, Mechéria!, D. Vosseler, (Mus. Stuttgart).

Descr.: Ab omnibus affinibus colore rubro cunei mox distinctus. Caput (♂) basi pronoti paullo minus quam duplo angustius, a latere visum altitudine longius, angulo faciali acuto, ab antico visum pronoto brevius. Rostrum articulo primo apicem xyphi prosterni attingente. Antennae articulo secundo margine basali pronoti parum brevior. Pronotum (♂) basi longitudine minus quam duplo latius, apice longitudine circiter $\frac{1}{4}$ angustius, lateribus subrectis, disco versus apicem sat fortiter declivi. Hemelytra maris abdomen longe superantia, parallela. Peoes lutei, femoribus innotatis.

27. *Orthotylus viridipunctatus* Reut.

Diagn.: Pallide flavescens, superne longius pallido-pubescentis, tomento albo maculatim disposito, hemelytris adhuc breviter nigro-pilosulis; hemelytris ubique maculis parvis obscure viridibus aequaliter et dense conspersis, membrana dilute griseo-fumata, iridiscente, venis albidis, areolis pallidis, maculis obscure viridibus dense conspersis; tibiis subtiliter pallido-spinulosis, posticis inferne basin versus punctis 7—8 obscure viridibus notatis; tarsis breviusculis articulis duobus ultimis aequae longis; capite (♀) transverso, basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ angustiore, vertice immarginato, clypeo fortiter prominente, basi in linea intermedia oculorum posita; rostro apicem coxarum intermediarum attingente. Long. ♀ $3\frac{4}{7}$ mm.

Hab. in Romania (Plainesci!), D. Montandon.

Descr.: Ab *O. Fieberi* Frey-Gessn. rostro longiore coloreque membranae mox distinguendus, ab *O. flavosparso* C. Sahlb., cui etiam affinis videtur, hemelytris viridipunctatis, membranae venis albidis, areolis punctis viridibus conspersis, tibiis posticis inferne basin versus viridi-punctatis