

Hab. in Aegypto (Cairo!), D. Dr Schmiedeknecht, comm. D. Dr Fokker.

Descr.: *O. quadriguttato* Kirschb. similis, differt corpore magis opaco, oculis majoribus, genis humilioribus, structura pronoti, ejus parte posteriore fortiter transversim strigosa, hemielytris formae brachypterae longioribus, fascia antica aliter formata, macula anteapicali subquadrata nec triangulari, cuneo magis discreto, longiore. Caput f. brach. basi pronoti distincte angustius (♀), vertice oculo fere duplo latiore (♀), utrinque ad oculum foveola transversali instructo. Rostrum albidum, articulo primo fusco-ferrugineo, medium xyphi prosterni subattingente. Antennae speciminis mutatae. Pronotum f. brach. basi longitudine paullo latius, lateribus sat leviter sinuatis. Hemielytra f. brach. apicem abdominis subattingentia.

27. *Plagiotylus dispar* Reut.

Diagn.: Virescens, superne nigro-setosus, hemielytris maris longis, vinaceo-rubris, membrana obscurius fumata, maculis nigricantibus signata, venis rufescentibus, feminae abbreviatis, virescentibus, segmenti quarti dorsalis vix superantibus, apice singuli elytri aequaliter rotundato medio brevissime subacuminato; femoribus posticis inferne seriatim fuscescenti-maculatis, tibiis longe nigro-spinulosis, tarsorum articulo ultimo apice nigro. Long. ♂ $6\frac{2}{3}$, ♀ brachypt. $4\frac{2}{5}$ — $4\frac{1}{2}$ mm.

Hab. in Syria (Jerico!), D. Prof. J. Sahlberg.

Descr.: A *Pl. maculato* Scott magnitudine, structura antennarum, colore hemielytrorum maris structuraque eorum feminae distinctus. Corpus valde oblongum (♂) vel breviter late ovatum, sat planum (♀), virescens, sat nitidum, superne nigro-pilosum, Caput basi pronoti circiter $\frac{3}{7}$ (♂) vel paullo (♀) angustius, vertice oculo paullo minus (♂) vel paullo magis quam (♀) duplo latiore, clypeo verticali, prominente, basi e fronte impressione profunda discreto, ipsa basi infra lineam inter-antennalem posita, genis altis (♂) vel altissimis