

lutius lutescenti-rubris, clavo vena et saepe etiam apice sat late, corio angulo interiore limboque laterali, nec non cuneo lutescentibus; cetero ut typus.

Hab. in Syria (Akbès!), D. Dr Puton.

30. *Phytocoris Bleusei* Reut.

Diagn.: Oblongus (σ), sordide albidus, ferrugineo et nigro-signatus, tomento albo intricato-pubescentis, pilis nigris retrorsum adpressis; capite dense obscure ferrugineo-signato, fronte transversim striata, pronoto dimidio apicali dense minute ferrugineo-conperso, basi striis quatuor transversalibus nigris, scutello medio fusco-signato, hemielytris parte exteriore clavi, corio juxta suturam clavi et apice nec non cuneo apicem versus densius nigro-variegatis, apice corii macula typica pallida signata, margine lateral i sat remote nigro-maculata, membrana dense nigro-irrorata, venis flavo-testaceis, cubitali nigra; capite leviter nutante, a latere viso altitudini aequa longo, fronte parum declivi, apice truncata, clypeo toto prominente, a supero viso (σ) latitudini posticae fere aequa longo, vertice oculo paullo minus quam duplo latiore; oculis maris a supero visis suborbicularibus; antennis articulo primo sat fortiter incrassato, setis rigidis crassitiei articuli vix aequa longis, pronoto aequa longo, fusco-ferrugineo, albo-conperso, reliquis testaceis, basi anguste pallidioribus, secundo primo vix duplo longiore; femoribus basi excepta nigro-fuscis, subtiliter albido-guttulatis, tibis anticis basi, apice annulisque duobus nigris, intermediis parce nigro-adspersis, posticis basi annulisque duabus minus distinctis nigro-conspurcatis; hemielytris (σ) abdomen sat breviter superantibus. Long. σ 4 $\frac{4}{5}$ mm.

Hab. in Algeria (Ain Sefra!, D. Bleuse), comm. D. Dr Puton.

Diagn.. *Ph. vittigero* Reut. et *Chicotei* Bol. proximus, ab ambobus magnitudine multo minore verticeque manus latiore mox distinguendus, ab illo colore signaturaque pronoti et hemielytrorum, antennarum articulo primo fortius incrassato, ab hoc articulo primo antennarum albo-pube-