

anticis basi, apice annulisque duobus latis fulvis, etiam posterioribus basi late fulvo-conspureatis; pectore fulvo-variegato; abdomine densissime fusco vel nigricanti-conspureato; capite a supero viso fere aeque longo ac postice lato, a latere viso altitudinem saltem latitudine clypei superante, fronte horizontali, ipso apice perpendiculari, clypeo toto fortiter prominente, vertice linea tenui longitudinali impressa, maris oculo circiter $\frac{2}{5}$ latiore, oculis a supero visis sub-obicularibus. Long. ♂ $6\frac{2}{5}$ mm.

Hab. in Algeria (Ain Sefra!), D. Bleuse, comm. D. Dr Puton.

Descr.: *Ph. niveato* Horv. proximus, statura angusta similis, notis superne datis facillime distinctus. Caput pronoto distincte brevius, hujus basi circiter $\frac{2}{5}$ angustius, albidum, genis vitta inferiore longitudinali aliaque pone oculum fuscis. Oculi fuscis. Rostrum apicem coxarum posteriorum attingens, apice nigro-piceum. Antennae articulo secundo margine basali pronoti circiter dimidio longiore; tertio fulvo, hoc apicem versus quartoque pallidis, tertio secundo parum magis quam $\frac{1}{6}$ brevior, quarto primo fere aeque longo. Pronotum latitudine basali parum magis quam $\frac{1}{5}$ brevius, apice basi circiter $\frac{3}{5}$ angustiore, disco versus apicem leviter declivi, marginibus lateralibus rectis; albicans, omnium levissime fulvicanti-punctatum. Scutellum albicans, parte apicali vel totum subtiliter fulvo-conspureatum. Hemielytra maris parallela, abdomen circiter $\frac{2}{5}$ longitudinis superantia, atomis nonnullis in venis positae relipuis paullo majoribus. Pectus albicans, fulvo-conspureatum. Segmentum maris genitale muticum. Tibiae spinulis pallidis modice longis.

32. *Trigonotylus pallidicornis* Reut.

Diagn.: Angustus, stramineus, capite linea longitudinali verticem et frontem percurrente, pronoto vitta utrinque laterali vittisque duabus discoidalibus valde appropinquatis fuscis; antennis totis pallide stramineis, glabris, arti-