

apice lateribusque nigro-conspurcatis, ante marginem basalem fascia sat lata nigra margine postico undulata signato; scutello ante apicem macula utrinque marginali nigricante; hemielytris parcius sat aequaliter nigricanti-conspurcatis, area parva apicali triangulari innotata, interne vitta obliqua nigra terminata; membrana hyalina, venis albidis, minute et dilute cinerascanti-conspersa, limbo externo macula ad apicem cunei aliaque majore media innotatis, hac interne vitta cinerea terminata, femoribus apicem versus nigro-maculatis, tibiis breviter albo-spinosis, anterioribus annulis tribus nigris, posticis annulis duobus ante medium positus nigris, his minute nigro-punctatis, omnibus basi et apice concoloribus. Long. ♂ 5 mm.

Hab. in Turcomannia (Perevat!), D. Ahnger.

Descr.: In vicinitate *Ph. Fieberi* Bol. locandus videtur. Caput speciminis unici sat mutilatum. Rostrum segmentum genitale maris attingens, album, apice late nigrum. Antennae articulo primo sat parce nigro-adsperso, basi apiceque nigro, setis rigidis paucis tenuibus crassitie articuli vix longioribus (an setae detritae?), articulo secundo basi pronoti paullo longiore. Pronotum lateribus obsoletissime sinuatis, basi longitudine usque ad anulum apicalem duplo latiore, annulo apicali lateribus maculisque duabus mediis nigris, lateribus nigricanti-conspersis, disco late innotato, fascia nigra basali inaequali. Corpus inferne albidum, albo-pubescent, lateribus nigricanti-conspurcatum. Segmentum maris genitale ad angulum sinus sinistri aperturae muticum. Spinulae tiliarum anteriorum crassitie tibiae vix, posticarum paullo longiores.

5. *Phytocoris Sahlbergi* Reut.

Diagn.: Albidus, albo-pubescent, hemielytris pilis brevibus nigris retrorsum adpressis, facillime divellendis; capite pronotoque parcius fusco-ferrugineo-adsperis, scutello vittis duabus apicalibus fuscis, hemielytris parcius praecipue limbo laterali et circa venas fusco-conspurcatis, corio apice