

soletis. Oculi fusci, feminae a supero visi suborbiculares. Rostrum (σ^7) medium ventris subattingens, albidum, dimidio apicali nigro-piceum. Antennae (φ brachypt.) articulo secundo primo vix magis quam $\frac{2}{3}$ longiore. Pronotum parce fuscescenti-ferrugineo-adsersum, feminae planum, basi longitudine, strictura apicali excepta, duplo latiore, apicem versus sat leviter angustatum, margine basali supra scutellum leviter latissime sinuato. Hemelytra (φ brachypt.) commensura scutello fere duplo longiora, cuneo distincte leviter declivi, longitudine paullo latiore, apice late rotundato, membrana solum ad marginem ejus interiorem distinguenda, lineari. Pectus et venter utrinque lateribus linea longitudinali fusca magis minusve distincta signata, venter longius albido-pubescentis. Pedes subtiliter albido-pubescentes, tibiis spinulis e punctis minutis fuscescentibus nascentibus, crassitie tibiarum saltem aequae longis.

6. *Deraeocoris ater* Jak. var. *limbicollis* Reut.

Ut typus, sed pronoto strictura apicali lateribusque, his late, pectore, medio excepto, basi lateribusque ventris, femoribus apicem versus tibiisque testaceis; antennis feminae totis nigris; a *D. rubro* L. (*segusino* Muell.) var. *danico* F. capite nigro, solum vertice testaceo, antennis paullo longioribus, corio toto nigro fasciaque cunei angustiore, magis obliqua, albida divergens φ .

Amuria!, D. E. Saunders.

7. *Plagiorrhama concolor* Reut. — Hem. Gymn. Eur. IV, 140, 2.

Hab. etiam in Turkestan (Bekljär-bek! d. $\frac{18}{8}$), D. Prof. J. Sahlberg.

Obs. *Mus* a femina differt: capite basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, vertice oculo circiter duplo et $\frac{1}{3}$ latiore; pronoto basi longitudine fere duplo et dimidio et apice fere