

areolis albo-hyalina vel dense cinereo-irrorata, venis flavo-virentibus, macula ad apicem cunei aliaque majore limbi exterioris albido-hyalinis; antennis articulo primo annulo anteapicali, secundo annulo basali punctisque duobus basali-bus nec non ima basi articuli tertii nigris; femoribus posti-cis apicem versus punctis sat magnis nigris adspersis, tibiis basin versus dense apicem versus remotius nigro-punctatis, spinulis albidis. Long. ♀  $2\frac{1}{3}$  mm.

*Hab.* in *Salsolaceis*: Turcomannia (Repetek! d. 17 aug.), D. Prof. J. Sahlberg.

*Descr.:* Signaturis distinctissima. Caput (♀) basi pro-noti circiter  $\frac{1}{4}$  angustius, sub-ochraceum, ab antico visum latitudine cum oculis parum brevius, a latere visum altitu-dini basali longitudine subaequale, vertice oculo  $\frac{2}{3}$  — fere duplo lato, fronte valde declivi, clypeo usque a basi pro-minente, basi in linea media oculorum posita, angulo fa-ciali recto, gula haud distinguenda. Oculi fusci, granulati, in genas longe extensi. Rostrum apicem coxarum postica-rum attingens, albidum, apice nigro, articulo primo basin capitis parum superante. Antennae (♀) articulo secundo margine basali pronoti paullulum breviore, duobus ultimis simul sumtis secundo parum longioribus, tertio secundo cir-citer  $\frac{1}{4}$  breviore. Pronotum basi longitudine duplo lato, apice longitudine saltem  $\frac{1}{3}$  lato, marginibus lateralibus atomis nonnullis nigricantibus signatis. Hemielytra (♀) api-cem abdominis modice superantia. Corpus inferne virescens. Femora antica fere innotata, postica praecipue margine antico nigro-punctata. Tarsi articulo tertio ipso apice dilute fuscescente, ungviculis fuscis, aroliis latis fere apicem un-guiculorum attingentibus.

### 17. *Atomophora bipunctata* Reut.

*Diagn.:* Albicans, superne sat fortiter albo-pubescent, hemielytris ubique punctis fuscis adspersis, solum basi cunei innotata, cuneo angulo interiore macula parva ovali nigra notato; membrana dilute fumata, venis albidis, areola