

20. *Oncotylus pilosicornis* Reut.

*Diagn.*: Pallide sordide albido-flavens vel leviter in virescentem vergens, opacus, unicolor, inferne tenuiter pallido-pubescentem, superne ubique sat longe nigro-setosus, setis hemielytrorum suberectis vel semi-erectis e punctis minutis fuscis nascentibus; capite ab antico viso transverso ( $\sigma^7$ ) vel latitudini cum oculis fere aequae longo ( $\varphi$ ), vertice oculo circiter  $\frac{2}{3}$  ( $\sigma^7$ ) vel duplo et  $\frac{2}{5}$  ( $\varphi$ ) latiore; antennis colore corporis, gracilibus, articulo secundo margine basali pronoti paullulum longiore, sat tenuiter pubescente ( $\varphi$ ), vel hoc saltem  $\frac{1}{6}$  longiore, leviter crassiusculo, superne pubescente sed inferne adhuc pilis longis fuscescentibus exsertis sat dense pilosis, ultimis simul sumtis secundo aequae longis ( $\sigma^7$ ) vel paullo longioribus ( $\varphi$ ), quarto tertio duplo ( $\varphi$ ) vel paullo magis quam duplo ( $\sigma^7$ ) brevioribus; pedibus colore corporis, tibiis longe sat tenuiter nigro-spinulosis, tarsis fuscis; membrana cum areolis totis fumata, venis pallide flaventibus, macula inter apicem cunei et apicem areolae minoris nec non alia majore postice dilatata infra apicem areolarum hyalinis, hac interdum in marginem exteriorem extensa et ab illa macula fumata disjuncta. Long.  $\sigma^7$  5,  $\varphi$   $4\frac{1}{2}$  mm.

*Hab.* in Sibiria orientali (Irkut!), D. Leder (Mus. Vindob.).

*Descr.*: Ab *O. affini* Jak. pronoto fortius transverso, colore membranae, tarsis totis fuscis, praecipue articulo secundo antennarum maris longe piloso distingvendus; ab *O. Horvathi* Reut. colore pilositateque antennarum maris, articulis ultimis secundo saltem aequae longis, quarto tertio saltem duplo brevioribus, pronoto fortius transverso, tibiis punctis destitutis, corio nebula apicali fuscescente destituto, membrana aliter colorata divergens. Caput basi pronoti circiter  $\frac{3}{7}$  angustius, a latere visum altitudini basali aequae longum ( $\varphi$ ) vel hac paullo longius ( $\sigma^7$ ), genis mediocribus ( $\varphi$ ) vel sat humilibus ( $\sigma^7$ ), gula peristomio brevioribus, angulo faciali distinctius ( $\sigma^7$ ) vel leviter ( $\varphi$ ) acuto. Oculi virescentes, maris majores et magis convexi. Rostrum apicem coxarum posticarum attingens, apice nigro, articulo primo me-