

paullo superantia. Tarsi postici articulo ultimo secundo aequae longo.

### 23. *Excentricus pictipes* Reut.

*Diagn.*: Niger, nitidulus, superne sat longe nigro-pilosus, squamulis argenteis facillime divellendis, capite porrecto vel levissime nutante, vertice stria transversali ferruginea; bucculis albidis; rostro apicem coxarum posticarum distincte superante, articulo primo caput parum superante, ad magnam partem sordide albido; antennis articulis duobus primis nigris, dense breviter nigro-pilosis, articulo primo valde tumido-elevato, secundo fortiter tumido-fusiforimi et primo fere duplo longiore, apicem quam basin versus fortius et longius angustato, diametro maximo circiter triplo et dimidio (♀) vel fere quadruplo (♂) longiore, ultimis nigro-fuscis, tertio basi albida, raro pallidis, simul sumtis secundo circiter  $\frac{1}{5}$  brevioribus, quarto tertio circiter  $\frac{1}{3}$  brevioribus; pronoto versus apicem leviter declivi, plano, margine basali circiter  $\frac{2}{5}$  — fere  $\frac{1}{3}$  brevioribus, disco postico cum scutello subtilissime transversim strigoso; membrana nigricante, venis albidis vel saltem connectente apiceque brachialis albidis, macula parva anguli exterioris basalis hyalina; acetabulis macula externa laterali alba; apice imo femorum tibiisque albidis, his omnibus nigro-spinulosis, basi, linea basali inferiore, apice nec non maculis magnis nigris, anticis parte fere dimidia apicali ante apicem innotata vel solum puncto minore signata. Long. ♂ ♀ 4 mm.

*Syn.*: *Excentricus punctipes* Fieb. var. *pictipes* Reut., Hem. Gymn. Eur. I, 91, 2.

*Hab.* in Dauria (Irkutsk!), Dr F. Sahlberg; in Mongolia boreali!, D. Leder (Mus. Vind.).

*Descr.*: Ab *E. singulari* Horv., cui maxime affinis videtur, membrana saltem vena connectente albida tibiisque anticis saltem dimidio basali maculis magnis (circiter tribus) signatis distingvendus; ab *E. punctipedi* Fieb. et *oophoro* Horv. structura antennarum et pronoti divergens. Caput