

basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ angustius, ab antico visum latitudine distincte longius, a latere visum altitudine basali circiter dimidio longius, gula sat leviter obliqua dimidium capitis occupante, vertice oculo circiter duplo latiore. Oculi exserti. Antennae articulo primo vertice et fronte simul summis paullo breviore, apice clavato, latitudine maxima articuli secundi paullulum angustiore; articulis duobos primis feminae iisdem maris crassioribus; articulo secundo latitudine capitis parum longiore. Pronotum apice sinuato, lateribus subsinuatis.

24. **Plagiognathus albipennis** Fall.

Var. extrema Reut.: superne tota albida, etiam inferne albicans, ventre albido-virente, antennis albidis, articulo primo extremaque basi secundi nigris; femoribus albidis, nigropunctatis; cetero ut in typo. Long. $1\frac{3}{4}$ —2 mm.

Turkestan (Constantinovskaja!), D. J. Sahlberg.

25. **Neocoris aenescens** Reut.

Diagn.: Niger, aeneo-nitens, parte apicali scutelli hemielytrisque fuscescenti-nigris, nitidis, pilis albis squamiformibus faciliter divellendis vestitis, basi margineque apicali corri nec non clavo apicem versus pallidioribus, membrana nigricanti-infumata, venis albido-flaventibus; antennis fusco-testaceis, articulo secundo basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ breviore, apicem versus late nigricante; pectore minus nitido albo-squamoso, orificiis testaceis; coxis nigro-piceis, apice albidis (pedes speciminis desunt); vertice lateribus distinctius medio omnium tenuissime marginato. Long. ♀ $3\frac{1}{4}$ mm.

Hab. in Mongolia boreali, D. Leder (Mus. Vindob.).

Deser.: A. speciebus reliquis hujus generis corpore fortiter aeneo-nitente mox distinctus. Caput nigro-aeneum, nitidissimum, basi pronoti circiter $\frac{3}{8}$ angustius, ab antico visum latitudini verticis oculique unici aequo longum, a latere visum altitudine multo brevius, clypeo basi a fronte