

tudine capitis circiter $\frac{1}{3}$ (♀) vel saltem dimidio — $\frac{2}{3}$ (♂) longiore, maris crassiusculo, feminae gracili; tibiis nigro-spinulosis; tarsis obscuris. Long. ♂ $4\frac{2}{5}$, ♀ 4 mm.

Hab. in Tamaricc: Turkestan (Kokmuinak ad flumen Tschu! d. 20 juli), D. Prof. J. Sahlberg.

Descr.: *T. Montandoni* Reut. affinis, differt vertice angustiore, pronoto apice longitudine haud vel parum latiore tarsisque obscurioribus; a *T. tamaricis* Perr. corpore majore, capite paullo majore, hemielytris clavo aliter picto, praecipue autem antennis multo longioribus divergens. Caput apice pronoti paullo latius, ab antico visum latitudini frontis oculique unici longitudine subaeqvale, gula omnium brevissima. Oculi fusti, modice granulati, maris magni, feminae mediocres. Rostrum apicem coxarum posticarum attingens, apice nigro. Antennae sordide lutescentes, corpori, hemielytris exceptis, longitudine subaeqvales, articulo secundo latitudini basali pronoti aequo longo (♀) vel (♂) paullo longiore, tertio secundo vix magis quam $\frac{1}{7}$ (♂) breviore, quarto tertio fere triplo (♂) breviore. Pronotum basi longitudine circiter duplo latiore, apice longitudini aequo lato vel hac parum latiore, lateribus maris plerumque leviter sinuatis, feminae rectis. Dorsum abdominis magis minusve late nigricans. Corpus inferne virescens, post mortem saepe pallescens, ventre pube brevi nitida albida. Pedes colore corporis, tibiis summo apice fusco, tarsis plerumque articulo primo et ultimo fuscescentibus, tarsis posticis tibia paullulum minus quam triplo brevioribus, articulo ultimo duobus primis simul sumtis distinete breviore, secundo aequo longo, ungivulis longis, leviter curvatis, aroliis haud distinguendis.

27. *Tuponia tibialis* Reut.

Diagn.: Inferne dilute virescens, superne virescenti-albicans, albo-pubescent, scutello basi ochracea, maris saepe vitta media virescente; hemielytris albidis, unicoloribus vel clavo apice sat late corioque fascia apicali fuscescentibus,