

faciali acuto, genis feminae mediocribus, gula distincta; oculis laevibus, sat magnis; rostro apicem coxarum posticarum attingente; antennis paullo supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo apicem clypei haud superante, secundo latitudine capitis longiore; pronoto margine apicali late sinuato, callis haud discretis; pedibus punctis obscurioribus destitutis, tibiis nigro-spinulosis, tarsis posticis articulo tertio secundo aequae longo, unguiculis modice curvatis, aroliis distinctis medium unguiculorum attingentibus.

Habitat species unica hactenus cognita in territorio mediterraneo.

Descr.: Genus ab omnibus reliquis pedibus pallidis et inpunctatis tibiisque nigro-spinulosis instructis corpore pilis metallicis dense tecto mox distinctum. Caput a latere visum altitudine basali paullo brevius, versus apicem sensim declive, clypeo sat prominente, basi supra lineam inter bases antennarum ducendam sed vix in linea intermedia oculorum posita; gula sat brevi. Oculi sat convexi, orbita interiore paralleli, feminae in genas modice extensi. Rostrum articulo primo caput parum superante. Antennae articulo secundo apicem versus sensim leviter incrassato. Pronotum trapeziforme, margine basali lateribusque rectis, disco apicem versus levissime declivi. Scutellum basi obtectum. Hemelytra explicata, feminae lateribus parum rotundata, cuneo latitudini basali vix aequae longo. Alae areola hamo a vena sustensa emisso, a basi venae decurrentis sat remoto. Xyphus prosterni convexus. Coxae anticae apicem mesosterni subattingentes. Femora postica feminae levissime incrassata.

Chrysochnodes vestitus Reut.

Diagn.: Sat obscure sordide virescenti-olivaceus, sat nitidus, pilis squamiformibus aureis dense vestitus, superne nigro-pubescentis; membrana fumata, venis pallidis, linea angusta inter areolam minorem et apicem cunei hyalina mar-