

gini cunei adjectente, areola minore hyalina disco fumata; tibiis sat longe nigro-spinulosis, extremo apice nigricantibus, tarsis articulo primo apiceque ultimi nigricantibus. Long. ♀ $3\frac{1}{2}$ mm.

Hab. in Algeria (Azazga!), D. Saunders.

Descr.: Caput basi pronoti circiter $\frac{3}{7}$ angustius, vertice oculo circiter duplo latiore (♀). Oculi badii, ultra angulos anticos pronoti leviter prominuli. Rostrum apice nigro. Antennae articulo secundo margine basali pronoti paullo brevior. Pronotum basi longitudine solum circiter $\frac{3}{4}$ latiore, apice longitudini vix aequo lato. Hemelytra feminae abdomem paullo superantia. Alae venis fuscis. Tarsi postici tibiis circiter triplo breviores. Terebra feminae longissima.

4. *Psallopsis* Reut.

Corpus ovale, pallidum, capite verticale, basi pronoti saltem $\frac{1}{4}$ angustiore, infra apicem oculorum modice producto, transversali, a latere viso altitudine basali multo brevior, fronte clypeoque perpendicularibus, vertice postice tenuiter marginato, margine acutiusculo, clypeo ab antico viso sat lato, parum compresso, a latere viso aequo lato, angusto, latissime arcuato, leviter prominente, basi a fronte haud discreto, ipsa basi in linea intermedia oculorum posita, angulo faciali subrecto, genis humilibus, gula vix distinguenda; oculis minute granulatis, in genas longius extensis; rostro coxas posticas paullo superante; antennis paullo supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo apicem clypei haud superante, secundo latitudine capitis longiore; pronoto brevi, fortiter transverso, trapeziformi, margine apicali subrecto, marginibus lateralibus basali que rectis; scutello basi detecto; alis hamo areolae a vena sustensa emissio; prosterno utrinque lateribus impresso, xypho convexo; coxis anticis medium mesosterni longe superantibus; femoribus posticis longis et valde dilatatis, saltatoriis, dimidio apicali marginis anterioris setis quinque longis exsertis instructo;