

tio paullo minus quam duplo brevior. Pronotum basi longitudine circiter duplo et dimidio latiore, apice longitudine saltem dimidio latiore, disco versus apicem omnium levissime declivi. Femora postica (♀) margine antico apicem versus setis quinque fuscis. Tarsi albidī, postici tibia vix $\frac{3}{5}$ breviores. Unguiculi fusci, aroliis hyalinis.

5. *Psallus Saundersi* Reut.

Diagn.: Superne albus, albo-pubescent, pilis nigris destitutus; antennis articulo primo interne ante apicem atomis duobus nigricantibus; hemielytris atomis omnium subtilissimis nigricantibus aequaliter conspersis, limbo laterali corii innotato; femoribus aequaliter dense nigricanti-punctulatis, tibiis spinulis tenuibus albidis e punctis minutis nigricantibus nascentibus. Long. ♂ $2\frac{2}{3}$ mm.

Hab. in *Thymelaea macrophylla*: Algeria (Biskra! d. 21 aprilis 1894), commun. D. E. Saunders.

Descr.: *Ps. pumilo* Jak. affinis, pronoto scutelloque punctis destitutis, hemielytris aequaliter (etiam basi cunei) fusco-punctatis, punctis multo minoribus, colore articuli primi antennarum, spinulis tiliarum brevioribus albis divergens; a *Ps. absinthii* Scott statura minore, pronoto scutelloque innotatis, atomis hemielytrorum minutissimis, spinulis tiliarum albis, brevioribus et tenuioribus distinctus. Caput (♂) basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustius, ab antico visum transversum, vertice oculo circiter $\frac{3}{4}$ latiore, clypeo prominulo, basi a fronte parum discreto. Oculi maris magni, fortiter granulati. Rostrum apicem coxarum posticarum attingens, apice nigro. Antennae articulo secundo maris sublineari, nonnihil crassiusculo, margine basali pronoti circiter $\frac{1}{4}$ brevior. Pronotum breve, fortiter transversum, basi longitudine paullo magis quam duplo latiore, apice longitudine distincte latiore. Hemielytra membrana opalino-alba, vivaciter iridescente, venis albidis.