

abdomen longe ( $\sigma$ ) vel breviter ( $\varphi$ ) superantia. Pectus rubrum vel fusco-rubrum, orificiis pallidioribus. Tibiae anteriores extrema basi, posticae basi late rubrae. Tarsi apice fusi.

### 9. *Orthotylus albovittatus* Reut.

*Diagn.*: Dilute virescens, nitidus, superne nigro-pilosus-capite, pronoto basique scutelli vitta angusta vel linea me, dia longitudinali albida signatis; membrana dilute fumata, venis areolisque virescentibus; vertice ( $\sigma$ ) subochraceo, immarginato, oculo parum minus quam duplo latiore; rostro apicem coxarum posticarum attingente; antennis articulo secundo latitudine postica pronoti distincte longiore; tibiis tenuissime pallido-spinulosis; tarsis posticis articulo tertio secundo aequo longo. Long.  $\sigma$   $3\frac{3}{4}$  mm.

*Hab.* in Algeria (Oran!), D. Mathieu, commun. D. Montandon.

*Descr.*: Species capite, pronoto scutelloque linea longitudinali albida signatis ab omnibus affinibus mox distinguenda. Corpus maris valde oblongum. Caput ( $\sigma$ ) basi pronoti circiter  $\frac{3}{7}$  angustius, ab antico visum leviter transversum, clypeo fortiter prominente, genis sat angustis, gula subhorizontali (?). Rostrum apice nigro. Pronotum basi longitudine fere paullo magis quam duplo latiore, apice longitudine distincte latiore. Hemielytra ( $\sigma$ ) abdomen dimidio longitudinis superantia. Segmentum genitale maris mediocre. Tibiae posticae tarsis fere quadruplo longiores.

### 10. *Dimorphocoris lateralis* Reut.

*Diagn.*: Oblongus ( $\sigma$ ) vel late obovatus ( $\varphi$ ), superne pilis squamiformibus aeneis facile divellendis vestitus, capite pronotoque parcus nigro-setosis; fuscescens-ferrugineus ( $\varphi$ ) vel ferrugineo-fuscus ( $\sigma$ ), marginibus lateralibus pronoti limboque lato laterali hemielytrorum pallide ochraceis vel testaceis, maris connexivo seriebusque abdominis duabus dorsilibus macularum testaceis; verticis vittulis obliquis ( $\varphi$ ) vel