

losis; tarsis posticis articulo primo margine superiore brevi margine inferiore margini superiori secundi fere aequae longo, hoc margine inferiore breviorae, unguiculis breviusculis, sat fortiter curvatis.

Smicromerus saltans Reut.

Diagn.: Totus niger, opacus, cum pedibus squamis albis faciliter divellendis tectus, superne pilis retrorsum vergentibus vel in capite et pronoto ad partem suberectis nigris pilosus, antennis articulo secundo basin versus obscure ferrugineo (σ^7) vel sordide ferrugineo, apice et interdum etiam basi magis minusve late nigricante; tibiis basi tarsorum ferrugineis, illis nigro-spinulosis. Long. σ^7 $2\frac{1}{2}$, ♀ $2\frac{2}{5}$ — $2\frac{1}{2}$ mm.

Hab. in desertis arenosis Algeriae (Clairfontaine! d. 25 aprilis), D. Prof. J. Sahlberg.

Descr.: Caput basi pronoti paullulum angustius (σ^7) vel huic aequae latum, vertice oculo circiter duplo et $\frac{1}{3}$ (σ^7) vel paullo minus quam triplo latiore (♀). Antennae articulo secundo crassiusculo (σ^7) vel gracili (♀), margini basali pronoti aequae longo (σ^7 , ♀ brach.), tertio secundo circiter $\frac{3}{5}$ breviorae, quarto tertio paullo breviorae. Pronotum basi longitudine duplo (♀ brach.) vel distincte minus quam duplo (σ^7) latiore, apice longitudine circiter dimidio (♀) vel $\frac{1}{3}$ (σ^7) latiore. Hemielytra abdomen breviter superantia (σ^7), membrana tota nigricante, vel (♀ brach.) basin segmenti sexti dorsalis subattingentia, commissura apice divaricata. Femora postica latitudine maxima paullo magis quam triplo (♀) vel vix quadruplo (σ^7) longiora.

12. **Plagiotylus Sahlbergi** Reut.

Diagn.: Virescens, superne pilis albis facile divellendis subintricato-pubescentis, capite pronotoque nigro-pilosis, hemielytris abdomineque pilis nigris adpressis; hemielytris maris longis, membrana sat dilute piscescenti-fumata, maculis ni-